

A:

abaliena (Lorenz 1989, подвид *cribraria*) *Cribrarula* - отдельная, отличная.

abberrans (форма *grayana* и др. видов ципрей) – ненормальная, имеющая отклонение от типичного цвета, узора или формы.

abrolhensis (Lorenz 2002, подвид *exmouthensis*) *Cribrarula* – от названия острова Абролхос (Abrolhos), Западная Австралия.

achatidea (Sowerby, 1837) *Schilderia* – подобная агату, агатовая (*achates* – агат).

acicularis (Gmelin, 1791) *Erosaria* – щетинистая, колючая или исколотая. Относится к боковым вмятинам.

admirabilis (Lorenz 2002 подвид *mappa*) *Leporicyprea* - восхитительная, превосходная.

adusta (Lamarck 1810 подвид *succincta*) *Erronea* – загорелая, смуглая, обожженная, оливкового цвета.

aenigma Lorenz, 2002 *Nesiocyprea* – загадка.

aequinoctalis (Schilder, 1933 подвид *annetae*) – экваториальная, из района экватора.

africana (Lorenz & Hubert, 1993 форма *margarita*) – африканская.

akabensis – из залива Акаба (залив Красного моря между п-ми Аравийским и Синайским. Порт Акаба)

albanyensis (Raybaudi 1985 подвид *marginata*) *Zoila* – из района Олбани, Юго-Западная Австралия.

albuginosa (Gray, 1825) *Erosaria* – беловатая.

alexhuberti Lorenz & Hubert, 2000 *Austrasiatica* – в честь Алекса Хюберта (Prof. Alex **Hubert**, (14 May - Darmstadt) 1938-99 (16 Feb. - Erlangen) соавтора «Гида по ципреям мира». Видимо в честь Алекса Хюберта также назван *Muricopsis huberti* Radwin & D' Attilio, 1976. Фото из «Гида по ципреям мира».



alfredensis Schilder & Schilder, 1929 *Cypreaovula* – из порта Альфред, Южная Африка.

algoensis Gray, 1825 – из района залива Алгоа, Южная Африка.

aliguayensis (Van Heesvelde & Deprez 2002 форма *pulchella*) – из района острова Алигуэй (Aliguay) Филиппины.

aliwalensis (Lorenz 2002 подвид *mappa*) *Leporicypraea* – из района Аливальской отмели, Наталь, Южная Африка.

alveolus (Tapparone 1882 подвид *teres*) *Talostolida* – корытообразная.


amiges (Melvill & Standen 1904 подвид *chinensis*) *Ovatipsa* – чистая, четкая.

amoeba (Schilder. & Schilder форма *ursellus*) *Bistolida* – изменчивая, имеющая отличный узор.

amorimi (Raybaudi 1990 подвид *fultoni*) *Varyscypraea* – в честь Мануэля Аморима (Manuel **Amorim**), португальского дилера, работавшего в Ю. Африке. Фото справа – М.Аморим на Парижском Шелл Шоу



amphitales (гибрид) – окруженная цветами, согласно Шилдеру (пятна, напоминают цветы, разбросанные по полю).



anceyi (Vayssière 1905 форма *subviridus*) *Erronea* – в честь Цезара-Марии-Феликса Энсю (César-Marie-Felix **Ancey**), 1860-1906, французского малаколога, работавшего в Алжире. В честь него также названы: *Anceya* Bourguignat, 1885, *Moncetia anceyi* Bourguignat, 1885, *Cameronia anceyi* Bourguignat, 1885, *Fagotia anceyana* Bourguignat, 1884, *Grandidieria anceyi* Bourguignat, 1885, *Syrnolopsis anceyana* Bourguignat, 1885, *Trochonanina anceyi* Bourguignat, 1885, *Pleurotomella anceyi* Dautzenberg & H. Fischer, 1897. Jean-Marie Louis-Félix **Ancey**, 1835-1??? , также малаколог, возможно отец Цезара-Марии-Феликса. Коллекция Энсю была куплена дилером по фамилии Geref, который продал ее Бери Штилману (Stillman Berry – также дилеру).

andamanensis – из Андаманского моря.

androyensis Blocher & Lorenz, 1999 *Palmadusta* – Из района Андрой, Южный Мадагаскар.

angelicae (Clover 1974) *Zonaria* – в честь Анжелики Санджиол-оглу (**Angelica Segiouloglou**), жены известного греческого коллекционера и дилера турецкого происхождения Джорджа Санджиол-оглу, открывшего этот вид. Приведу перевод из оригинального описания: «от греческого «ангел» в честь любимой жены мистера Санджиол-оглу». На фото справа: П. Кловер, Анжелика, Джордж. фото с сайта Дж. Санджиол-оглу





angioyorum (Biraghi, 1978), *Erronea* – в честь четы Марио Анжиои (Dr. Mario Angioy 1920-96) (также *Alvania angioyi* van Aartsen, 1982) и Кети Николаи (Kety Nicolay), малакологов и издателей журнала "La Conchiglia". Фото слева.

angolensis (Odhner 1923 подвид *pyrum*) *Zonaria* – из Анголы.

angustata (Gmelin 1791) *Notocypraea* – тесная, узкая.

annae (Roberts 1869 форма *semiplota*) – в честь имени Анна. (Установить в честь какой конкретно Анны названа раковина – не удалось).

annettae (Dall, 1909) – в честь имени Аннета. (Установить в честь какой конкретно Аннетты названа раковина – не удалось).

annulus (Linnaeus, 1758) *Monetaria* – колечко, перстень.

arabica (Linnaeus 1758) *Mauritia* – покрытая аравийской вязью. (но не произошедшая из Аравии).


arabacula (Lamarck, 1810) *Pseudozonaria* – маленькая арабика.

archilyra (Van Heesvelde & Deprez 2006 подвид *capensis*) *Cypraeovula* – античная лира.

argella (Melvill 1888 подвид *helvolla*) *Erosaria* – цвета белой глины (греч. Argilla = белая глина).

argentata (Dautz. & Bouge 1933 форма *caputserpentis*) *Monetaria* – серебряная.

argus (Linnaeus 1758) *Arestorides* – Аргус- греческий мифический великан, сын [Геи](#), все тело которого покрыто глазами, часть из которых всегда бодрствовала. [Гера](#) приставила неусыпного А. стражем к [Ио](#), возлюбленной Зевса, превращенной в корову. По приказу Зевса А. был убит [Гермесом](#), предварительно усыпившим его игрой на свирели и рассказом о любви [Пана](#) к наяде [Сиринге](#). Гера разместила глаза последнего на хвосте павлина. Поэтому аргус иногда называют павлиньей ципреей.



armeniaca (Verco, 1912) *Umbilia* – (не произошедшая из Армении, а цветом похожая на) плоды абрикоса (*Prunus armeniaca*).

artuffeli (Jousseaaume, 1876) *Palmadusta* – в честь М.Артюфеля (М. Artuffel), коллекционера средиземноморских раковин.

asellus (Linnaeus 1758) *Palmadusta* – маленький ослик (везущий три темных мешка)

asiatica (Schilder & Schilder, 1939) – из Азии, азиатская.

astaryi (подвид *cumingii* Schilder 1971) – в честь Дж.С. Астери (Dr. J.C. Astasy) Франция.

astonensis (форма *edentula* ?) – из района залива Астон, Южная Африка.

atlantica (форма *iutsui* Raybaudi 1988) *Cypraeovula* – из Атлантики.

atriceps (форма *controversa* Sch. & Sch. 1938) – Это "латинизированное английское слово "безволосковый или безотростковый" - скорее всего, разговор идет о мантии, которая у *atriceps* отличается более короткими выростами.

aubreyana (подвид (форма, синоним) *surinamensis* (Perry 1811) – нет данных.

aurantium (Gmelin, 1791) *Lyncina* – золотая, имеющая "золотую", оранжевую окраску.

aurata (подвид или форма *jeniana* Raybaudi 1979) *Zoila* – золотистая, имеющая золотистую окраску.

Употребляется применительно к названиям золотистых вариаций и других ципрей.

australiensis (*cribraria* Lorenz 2002) *Cribrarula* - австралийская

autumnalis (син. *mus* Perry 1811) *Muracypraea* – осенняя

azumai (форма *gutatta* Schilder 1960) – в честь Азумы, японского конхиолога. Возможно это Dr. Masao **Azuma**, 1916 [*Dentiovula masaoi* Cate, 1973]. *Aperiovula takae* Cate, 1973 названа в честь Таке Азума (Mrs. Taka **Azuma**), его жены и *Dentiovula eizo* Cate & Azuma, 1973 названа в честь Eizo **Azuma**, нашедшего первый экземпляр.

azurea (форма *errones* Schilder 1968) – голубая.

Названия синонимов и вариаций:

abrolhensis (вариация *rosselli*) *Zoila* – из района островов Абролхос (это даже не синоним, а неописанная вариация; раковины данной вариации имеют отличия от описанных)

albanica (синоним *venusta roseopunctata* Raybaudi 1995) *Zoila* – предположительно из Олбани, Австралия.

albabasis (синоним *friendii vercoi* Raybaudi 1996) *Zoila* – с белым основанием.

albata (син. *angustata*, *casta*, *friendii* и др. видов ципрей) – беловатая.

albicans (синоним *friendii vercoi* Raybaudi 1996) *Zoila* – нет данных

albiflora (син. *mauritiana*) - возможно: с белыми цветами. Иногда встречаются раковины со светлой дорсальной поверхностью

albinea (син. *venusta* и др. видов ципрей) – белая, или беловатая.

albolutea (синоним *rosselli* Raybaudi 1985) *Zoila* – бело-желтая (бело-шафранного цвета).

albonitens – (син. *pantherina*) – ослепительно белая (лат. – nites – светить, сверкать). Используется дилерами как наименование формы, с преобладанием в окрасе белых или светлых цветов.

albosignata (синоним *rosselli* Raybaudi 1985) *Zoila* – с белыми отметками.

alga (Perry, 1811, син. *mappa rosea*) – напоминающая морские водоросли (algae).

alisonae (син. *pellucens*) – в честь Алисон Кей, гавайского малаколога. Dr. E. Alison Kay, 1928-, of the University of Haway, Honolulu [*Flabellina alisonae* Gosliner, 1979, *Trophonopsis kayae* T. Habe, 1981, *Sansonia alisonae* Le Renard Bouchet, 2000].



DR. ALISON KAY

(Photo by Betty Photo Services)



annulata (Gray, J.E., 1825, син. *mariae*) *Annerpona* - покрытая кольцами.

arenosa (Gray 1824, синоним *shilderorum*) *Lyncina* – песочная, песчаная.

armeniaca (синоним *venusta venusta* Raybaudi 1985) *Zoila* – абрикосовая.
см. выше.

atlantica (син. *spurca*) – из Атлантики.

atomaria (син. *punctata*) – очень маленькая.

atrata (син. *decipiens* и *thersites* Sullioti 1924) *Zoila* – одетая в черное, окутанная трауром.

Часто употребляется дилерами и коллекционерами в отношении очень темных, почти черных раковин многих видов

aurata (вариации *friendii* Raybaudi 1979) *Zoila* – имеющая золотистую окраску. Аналогично предыдущему имени, употребляется для золотистых вариаций ципрей.

B:

barbieri (Raybaudi 1986) *Purpuradusta* - в честь Жана-Пьера Барбье (Jean Pierre **Barbier**), французского коллекционера и дилера, живущего на о. Себу (Cebu), Филиппины. В его честь также названы: *Haustellum barbieri* R. Houart, 1992, *Conus (Cylinder) barbieri* Raybaudi Massilia, 1995.

На фото справа: Жан-Пьер Барбье, А. Медведев, Мишель Йордан. (фото с сайта <http://www.coneshells-am.ru>).



barclayi (Reeve, 1857) *Erronea* – в честь Дэвида Вильяма Баркляя (Sir **David William Barclay**, 1804-88), британско-австралийского коллекционера, который в конце 1850 –х годов проживал на Маврикии. Сэр Дэвид Барклай был английским пэром, членом палаты лордов. В его честь также названы: (*Naquetia barclayi* (Reeve, 1858), *Chicoreus barclayi* L. A. Reeve, 1858, *Pterynotus barclayanus* H. Adams, 1873).

bataviensis (подвид *ketyana* Logenz & Morrison 2001) – *ketyana* с побережья Батавия, Западная Австралия (названо в честь голландского корабля «Батавия», потерпевшего крушение в районе группы островов Абролхос в 1629 году).

barthelemyi (форма *moneta* Bernardi 1861) *Monetaria* – названа в честь Christophe Jérôme Barthelemy-Lapommeraye (1796-1969), куратора Марсельского музея (Muséum d'histoire naturelle de Marseille) France.

bealsi (подвид *hungerfordi* Mock 1996) *Notadusta* - в честь Марти Билс (Marty Beals), американского дайвера и коллекционера раковин.

На фото Марти Билс и Валерий Даркин. (с сайта <http://www.alfadarkin.com/>).



beckii (Gaskoin 1836) *Erosaria* – в честь Генриха Бека (Dr. Henrick Henricksen **Beck**, 1799-1863, датского натуралиста, в основном палеонтолога. *Lora beckii* (Møller, 1842), и похоже *Clathrosepta becki* McLean & Geiger, 1998, *Liocyma beckii* Dall, 1870, *Hexaplex beckii* R. A. Philippi, 1847].

beddomei (форма *hesitata* Schilder, 1930) *Umbilia* – в честь австралийского малаколога Чарльза Беддоме (Lieut. Charles Edward **Beddome**, 1839-98).

bernardi (Richard, 1974) *Erosaria* – в честь коллекционера и малаколога-любителя М. **Bernard** из Рапеете, Таити.

berinii (подвид *punctata* (Dautzenberg 1906) *Notadusta* – в честь французского коллекционера и администратора Берини (Berini) с о. Мадагаскар.

bettyensis (форма *algoensis* Raybaudi 1996) *Cypraeovula* – из бухты Бетти (Betty Bay) Южная Африка.

bicallosa (форма *guttata* Raybaudi) *Perisserosa* – с двумя наплывами («мозолями»).

bicolor (форма *pipperita* Gaskoin 1849) *Notocypraea* – двухцветная.

bicornis (подвид *mus* (Sowerby 1870) *Muracyprea* – двурогоя.

bimaculata (подвид *errones* (Gray 1824) *Erronea* – с двумя пятнами.

bistrinotata (Schilder & Schilder 1937) *Pustularia* – с двойными пятнами в трех местах.

bitaeniata (подвид *asellus* (Geret 1903) – с двумя лентами, повязками.

bizonata (форма *lutea* (Iredale 1935) *Palmadusta* – с двумя зонами.

blaesa (подвид *caurica* Iredale 1939) *Erronea* – шепелявящая, пришептывающая, смысл названия не понятен.

blandita (форма *minoridens* Melvill 1901) *Purpuradusta* – ласковая, нежная, мягкая.

boivini (Kiener 1843) *Erosaria* – в честь французского натуралиста Амеди Боивина (Amedée **Boivin**, 1797-1881), коллекционера конусов, опубликовавшего в 1864 году работу по конусам. *Anachis boivini* (Kiener, 1841) и *Conus boivini* L. C. Kiener, 1845.

boucheti (Lorenz 2002) *Palmulacypraea* - в честь Филиппа Буше (Philippe Bouchet), 1953-, - французский малаколог, куратор отдела моллюсков Французского музея истории природы, Париж. *Tjaernoieia boucheti* Warén, 1991, *Boucardicus boucheti* Fischer-



Piette, Blanc, Blanc & Salvat, 1993, *Perplicaria boucheti* Verhecken, 1997, *Ancistrobasis boucheti* B.A. Marshall, 1991, *Tellina (Moerella) boucheti* von Cosel, 1995, *Carminodoris boucheti* Ortea, 1979, *Tritonoharpa boucheti* Beu & Maxwell, 1987, *Phyllidiopsis boucheti* Valdes & Ortea, 1996, *Waikalasma boucheti* Buckeridge, 1996, *Splendrillia boucheti* Wells, 1995, *Antalis boucheti* Scarabino, 1995, *Cetoconcha boucheti* Poutiers &



Bernard, 1995, *Acremodontina boucheti* B.A. Marshall, 1995, *Calliostoma (Fautor) boucheti* B.A. Marshall, 1995, *Homologenus boucheti* Guinot & Richer-de-Forges, 1995, *Hermaea boucheti* Cervera, Garcia-Gomez & Ortea, 1991, *Mathilda boucheti* Bieler, 1995, *Kaiparathina boucheti* B.A. Marshall, 1993, *Paralophogaster boucheti* Casanova, 1993, *Condylocardia boucheti* Salas & von Cosel, 1991, *Cladocarpus boucheti* Ramil & Vervoort, 1992, *Chicoreus (Triplex) boucheti* Houart 1983, *Granulina boucheti* Gofas, 1992, *Manzonina (Manzonina) boucheti* Amati, 1992, *Xylodiscula boucheti* Waren, Carrozza & Rocchini in Warén, 1992, *Arene boucheti* Leal, 1991, *Rissoina (Rissoina) boucheti* Sleurs, 1991, *Siphonochelus (Siphonochelus) boucheti* Houart, 1991, *Mitrella boucheti* Drivas & Jay, 1990, *Prostheceraeus boucheti* Prudhoe, 1989, *Chiton (Tegulaplax) boucheti* Kaas, 1989, *Thysanodonta boucheti* B.A. Marshall, 1988, *Mitra (Nebularia) boucheti* Cernohorsky, 1988, *Cancellaria boucheti* Petit & Harasewych, 1986, *Terebra boucheti* Bratcher, 1981, *Proterato*

(*Eratoena*) *boucheti* Drivas & Jay, 1986, *Buccinum boucheti* Tiba, 1984, *Chicoreus boucheti* Houart, 1983, *Conus boucheti* Richard, 1983, *Glycymeris (Glycymerella) boucheti* Matsukuma, 1984, *Pisinna boucheti* Palazzi, 1982, *Chromodoris boucheti* Rudman, 1982, *Terebra boucheti* Bratcher 1981, *Palaina boucheti* Tillier, 1981, *Gadila boucheti* Nicklès, 1979 *Prochaetoderma boucheti* Scheltema & Ivanov, 2000, *Leptochiton boucheti* Sirenko, 2001, *Atagama boucheti* Valdés & Gosliner, 2001, *Haloginella boucheti* Boyer, 2001, *Perotrochus boucheti* Anseeuw & Poppe, 2001, *Cerithiopsis boucheti* Jay & Drivas, 2002, *Amaea boucheti* E.F. Garcia, 2003].

bouteti (форма *leviathan titan* Burg. & Arn. 1981 *Lyncina* - в честь Мишеля Буте (Michel **Boutet**) коллекционера с Таити, Французская Полинезия

brasiliensis (подвид *cinerea* Lorenz 2002) *Luria* – бразильская, из Бразилии.

bregeriana (Crosse 1868) *Contradusta* – в честь М. Брегера (M. Breger), коллекционера из Новой Кададонии.

brevidentata (Sowerby 1870) *Bistolida* – с короткими зубами.

brevirostris (подвид *globulus* Schilder & Schilder 1938) *Pustularia* – к короткими окончаниями (рострами).

brianoi (подвид *stolida* Lorenz 2002 *Bistolida* – в честь Бруно Бриано (Bruno **Briano**), 195?-, дилера и дайвера из Италии (Savona) *Buccinulum brunobrianoi* Parth, 1993 and *Lyria brianoi* Poppe, 1999.



Bruno и Иасорро Briano на Парижском Шелл-шоу.



Бруно Бриано

broderipii (Sowerby 1832) *Lyncina* - в честь Уильяма Бродерипа (William John Broderip) – 1789-1859 – зоолога-любителя, главный интерес для него представляла малакология. Описал несколько таксонов в 1820-х -30-х годах. Был одним из создателей Зоологического общества в 1826 г. Бродерип был соавтором (с Соверби) одного из капитальных трудов по конхологии 19 века. *Mitrella broderipi* G.B. Sowerby I, 1844, *Stigmaulax broderipiana* Récluz, 1844, *Natica broderipiana* Récluz, 1844, *Xanthochorus broderipii* Michelotti, 1841, *Conus broderipii* L. A. Reeve, 1844].



brunnea (форма *armeniaca* Raybaudi 1993) *Umbilia* – опаленная, коричневая.

burgessi (E. A. Kay, 1981) - в честь Кларенса Мильтона Бурджеса (Dr. Clarence Milton "Pat" Burgess, 1908-99), американского конхиолога и физика, автора книги "Cowries of the World"



George and Bunnie Cook, Dr. Pat Burgess, and Dr. Ed Dunlap in Dr. Burgess's garden, Honolulu, HI.



Синонимы:

bakeri (синоним *venusta* Gatliff 1916) *Zoila* – к сожалению не удалось найти, в честь кого названа раковина, но позволю себе привести цитату А. Ивлиева с форума клуба коллекционеров: «Есть смысл ее внести в ваш список... Хотя бы потому, что лично у меня есть сомнения - синоним это или форма... Многие "ламперы" - объединители считали ее чуть ли не подвидом или даже видом - вот ведь в чем парадокс! 😊😊😊А на мой взгляд, как форма - она вполне существует... Но с ней колоссальные проблемы - вначале так именовались раковины ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из ОДНОГО РАЙОНА, имеющие характерные черты - окрас и слегка растриванные окончания... Сейчас я столкнулся с тем, что так теперь называют практически все окрашенные в красновато-рыжие цвета венусты, с удлинненными окончаниями - из КАКОГО-БЫ района они не пришли... 😊😊😊». И, вдобавок, привести, где данное название было впервые упомянуто: «Victorian naturalist» 32; 147(1), 1916.

Возможно раковина была названа в честь:

1. Fred(erick) Baker, (29 Jan.) 1854-1938 (16 May), from San Diego, malacologist and collector also of e.g. crustaceans [*Paguristes bakeri* Holmes, *Rissoina bakeri* Bartsch, 1902, *Aesopus fredbakeri* Pilsbry & Lowe, 1932, *Eucheilota bakeri* (Torrey, 1909), *Cyclosalpa bakeri* Ritter, 1905, *Ischnochiton bakeri* W. G. Torr, 1912, *Alvania bakeri* (Bartsch, 1910), *Cerithiopsis bakeri* Bartsch, 1917, *Caecum bakeri* (Bartsch, 1920), *Rissoella bakeri* Strong, 1938, *Melanella bakeri* Bartsch, 1917, *Aspella bakeri* Hertlein & Strong, 1951, *Fusinus fredbakeri* (Lowe, 1935), *Turbonilla bakeri* Bartsch, 1912, *Philine bakeri* Dall, 1919, *Neaeromya bakeri* (Dall, 1916), *Bernardina bakeri* Dall, 1910, *Ophiopholis bakeri* McClendon, 1909]. {[Picture](#) / courtesy of R. Giannuzzi-Savelli} Also *Epitonium bakhanstranum* Keen, 1962 is named for Fred **Baker**, but also the US paleontologist-malacologist with the California Academy of Sciences: Dr. G Dallas Hanna, (q.v.) and Archibald McClure **Strong**, 1876-1951, all US malacologists are honoured in this name [*Acmaea strongiana* Hertlein, 1958, *Agatrix strongi* (Shasky, 1961), *Odostomia strongi* Bartsch, 1927, *Turbonilla strongi* Willett, 1931, *Pleurobranchus strongi* MacFarland, 1966]. Namesakes and US malacologist colleagues of F. Baker were Horace Burrington **Baker**, 1889-1971, Frank Collins **Baker**, 1867-1942, Edwin Perrin **Baker**, 1891-1966, and David K. **Baker**, 1915-53.

2. The Australian malacostran name *Euidotea bakeri* ?, 1??? is likely a tribute to W.H. **Baker**, 18??-19??, who worked on South Australian crabs during the two first decades of the 20:th century.

broctoni (guttata) Iredale 1930 – нет данных.

barbara (синоним *bregeriana* Kenyon 1902) *Contradusta* – значение неизвестно. Было дано цветовой вариации раковин из Новой Каледонии. Возможно - греч. - иноземец, чужестранец.

C:

caerulescens (подвид *errones* Schröter 1804) *Erronea* – голубого оттенка..

callista (*ssp. helvola*) (Shaw 1909) *Erosaria* – звездная, астральная.

camelopardalis (Perry 1811) *Lyncina* – жираф.

candida (подвид *clandestina* (Pease 1865) *Palmadusta*, также (форма *friendii vercoi* Raybaudi 1996) *Zoila* - сияющая, белая.

capensis (Gray 1828) *Cypraeovula* – с мыса (в данном случае Доброй надежды).

capricornica (Lorenz 1989) *Umbilia* – козерожья ципрея

caputanguis (форма *caputserpentis* (Schilder 1927) *Monetaria* - голова змеи.

caputdraconis (Melvill 1888) *Monetaria* – голова дракона.

caputophidii (подвид *caputserpentis* (Schilder 1927) *Monetaria* – нет данных.

caputserpentis (Linnaeus 1758) *Monetaria* - голова змеи.

carneola (Linnaeus 1758) *Lyncina* – имеющая телесный цвет.

cascabullorum . (форма *spurca verdensium* Talav. et al. 1986) *Erosaria* - Cascabullo – местное прозвище рыбаков, промысляющих около Сур-де-Тенерифе, Канарские о-ва

cassiaui granulata (Burgess 1965) – в честь доктора Пьера Кассю (Dr. Pierre Cassiau), Papeete, Tahiti.

casta (форма *comptonii mayi* Sch.& Summ. 1963) *Notocypraea* - чистая, непорочная.

castanea (Higgins 1868) *Cypraeovula* – каштановая.

catholicorum (Schilder & Schilder 1938) *Cribrarula* – в честь немецких католических миссионеров в Новой Британии.. Материал для описания таксона был собран в промежутке между Моуп (Moupe) и Карлеи (Karlei) в Новой Британии миссионерами, возглавляемыми П. Джозефом Шнейдером (P. Josef Schneider).

caurica (Linnaeus 1758) *Erronea* – неправильно латинизированное слово каури (cowry)..

cavatoensis (*ssp. Langfordi* Lorenz 2002) *Austrasiatica* – из Новой Каледонии, Вануату и Тонга.(ca-,va-,to-).

cernica (Sowerby 1870) *Erosaria* – отделенная (от *spurca*), по Ф. А. Шилдеру – возможно неправильно сформированное прилагательное от *cernere*).

cervinetta (Kiener 1843) *Macrocypraea* – маленький cervus.

cervus (Linnaeus 1771) *Macrocypraea* - олень.

chiapponii (Lorenz 1999) - в честь доктора Марко Чаппони (Dr Marco Chiapponi), итальянского коллекционера из Лекко (Лессо), который долгое время изучал род *Pustularia*.

childreni (Gray 1825) *Ipsa* – в честь John George **Children** (1777-1852) In 1821, (18 May - Tunbridge, England) 1777-1852 (1 Jan. - Halstead Place, Kent).
На фото справа.



chinensis (Gmelin 1791) *Ovatipsa* – китайская, из Китая.

chlorizans (подвид *erosa* Melvill 1888) *Erosaria* – зеленоватая, у раковин дорсум темного зелено-оливкового цвета.

chrysalis (форма *microdon* (Kiener 1843) *Purpuradusta* – куколка золотистой бабочки.

chrystostoma (подвид *ovum* Schilder 1927) *Erronea* – с золотыми зубами.

cicercula (Linnaeus 1758) *Pustularia* - маленький цыпленок (маленькая горошина).

cinerea (Gmelin 1791) *Luria* – пепельно-серая.

citrina (Gray 1825) *Erosaria* – лимонного цвета.

clandestina (Linnaeus 1767) *Palmadusta* – скрытая, среди раковин Линнея.

clarissa (*limacina* Lorenz 1989) *Staphylae* – в честь Клариссы Ньюман (Clarissa **Newman**, 1886-1977), вице-президента Всемирного Совета женщин.

clavicola (подвид *stolida* Lorenz 1998) *Bistolida* – stolida, обитающая на кораллах *Pavona clavus*.



cleopatra (форма *cumingii* Schilder & Schilder, 1938.) *Cribrarula* - в честь Клеопатры-легендарной древнеегипетской царицы. В интернете статью о Клеопатре можно прочесть, следуя по ссылке:
http://world.lib.ru/m/maslow_m_w/kleopatra.shtml.

cohenae (форма *fuscodentata* Burgess 1965) *Supraeovula* – в честь Ирис Коэн (Mrs. Iris Cohen, 1925) южно-африканского коллекционера (Fish Hoek), обнаружившей первый экземпляр.

colligata (Lorenz 2002) *Supraeovula* – собранная, связанная.

coloba (Melvill 1888) *Ovatipsa* – чахлая, низкорослая.

comma (подвид *cribraria* (Perry 1811) *Cribrarula* – с подобными запятой пятнами.

compta (подвид *cumingii* (Pease 1860) *Cribrarula* - нарядная, красивая, изящная.

comptonii (Gray 1847) – в честь Вильяма Комптона (Marquess of Northampton, William 4 Compton, (20 Aug.) 1818-97 (11 Sep.).

connelli (Liltved, 1983) *Cypraeovula* - в честь Алана Коннелла (Dr. Allan Donovan Connell, (11 Dec.) 1943-, of Durban, South Africa), первым обнаружившего *Cypraeovula connelli*, а также голотип *Terebra connelli* Bratcher & Cernohorsky, 1985. В его честь также названы: [*Drillia (Clathrodrillia) connelli* Kilburn, 1988, *Emarginula connelli* Kilburn, 1978, *Anthias connelli* Heemstra & Randall 1986].

consanguinea (форма *androyensis* (Bloecher & Lorenz 1999) *Palmadusta* - кровный родственник, кровная сестра.

consobrina (подвид *staphylaea* (Garrett 1879) *Staphylaea* – родственница, двоюродная сестра.

consueta (форма *marginata* Biraghi 1993) *Zoila* – привычная, обычная, рядовая.

contaminata (Sowerby 1832) *Palmadusta* – запятнанная, загрязненная.

continens (подвид *walkeri* (Iredale 1935) *Contradusta* – с континента (Австралийского).

contraria (подвид *thersites* (Iredale 1935) *Zoila* – противоположная, негативная по отношению к основному цвету раковины.

contrastriata (подвид *argus* (Perry 1811) *Arestorides* – контрастный Аргус. Пятна основания отсутствуют на стороне губы.

controversa (Gray, J.E., 1824) *Luria* – спорная.

coronata (Schilder 1930) *Cypraeovula* - увенчанная короной.

corrosa (форма *caurica dracaena* Gronovius 1781) *Erronea* - обгрызенная, изгрызенная.

coucomi (подвид *hungerfordi* Schilder 1964) "*Notadusta*" - в честь Седрика Коукома (Cedric "Cedie" Coucom, 19??-88) из Yeppoon, Queensland. Седрик Коуком (известный своей семье и друзьям как Сэдди), стал интересоваться раковинами во время ловли макрели с братом вдоль берегов Квинсленда в сороковых годах 20-го века. Это позволило ему побывать на различных рифах и островах и представило много возможностей для коллекционирования раковин. В 1962, после формирования Kerrel Bay Shell Club, Сэдди был в течение многих лет его секретарем. Он имел обширные знания о раковинах и написал множество статей для клубного журнала "Tidings". Главный интерес для него представляли ципреи и он постоянно обменивался новостями и фото с профессором Ф.А. Шилдером. В 1964 Шилдер назвал в честь Сэдрика ципрею, найденную на большой глубине в районе Южного Квинсленда. Стоянки в различных местах Большого барьерного рифа дали прекрасную возможность для фотографирования раковин и других морских обитателей в природной среде обитания.

За многие годы был скоплен обширный материал фотографий и слайдов. Погиб в результате несчастного случая в море в 1988 г.

courturieri (форма или син. *eglanthina*) – в честь Кутюрье (Courturier) 1848 – 1933.

coxeni (Cox 1873) – предположительно в честь Чарльза Коксена (likely Charles **Coxen**, 1809 - 1876), коллекционера из Квинсленда.



coxi f. *errones* – в честь доктора Джеймса Чарльза Кокса (Dr. James Charles Cox, 1834-1912), австралийского малаколога. [*Acanthochitona coxi* H. A. Pilsbry, 1894, *Chiton coxi* Pilsbry, *Erronea errones* (Linnaeus, 1758) f. *coxi* Brazier, 1872].

crakei (форма *saulae nugata* Cate 1968) *Palmadusta* – нет данных.

crassa (форма *carneola* Gmelin 1791) *Lyncina* – толстая, утолщенная.

cribellum (подвид *esontropia* (Gaskoin 1849) *Cribrarula* – маленькая *cribraria*.

cribraria (Linnaeus 1758) *Cribrarula* – сито, решето.

crossei (подвид *stolida* (Marie 1869) – в честь Джозефа Чарльза Кроссе (Joseph Charles Hippolyte **Crosse**, (1 Oct.) 1826-98 (7 Aug.), французского малаколога . [*Cornisepta crossei* (Dautzenberg & Fischer, 1896), *Cylichna crossei* B.D.D., 1886, *Sayella crosseana* (Dall, 1885), *Retusa crossei* (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1882), *Favartia crossei* Lienard, 1873.

cruickshanki (Kilburn 1972) *Cypraeovula* – в честь Рэя Круикшанка (Ray **Cruickshank**, 19??-, (of Gordon's Bay).

cuatoni (форма *boivinii* Kosuge 1983) *Erosaria* – в честь филиппинского дилера Е. Куатона.

cumingii (Sowerby 1832) – в честь знаменитого (если не самого знаменитого) британского коллекционера, малаколога Хьюга Куминга (1791-1865) Hugh **Cuming**, (14 Feb.) 1791-1865 (10 Aug.) [*Ibla cumingi* Darwin, 1851, *Metula cumingi* A. Adams, 1853, *Chiton cumingii* Frembly, 1827, *Paraspidosiphon cumingii* (Baird, 1868), *Naquetia cumingii* (Adams 1853), *Echininus cumingii* (Philippi, 1846), *Epitonium cumingii* (Carpenter, 1856), *Enaeta cumingii* (Broderip, 1832), *Tomlinula cumingii* (A. Adams, 1854), *Tellina cumingii* Hanley, 1844, *Cumingia* Sowerby, 1833, *Solecortus cumingianus* Dunker, 1861, *Polinices cumingianus* Récluz, 1844, *Chicoreus cumingii* A. Adams in H. & A. Adams, 1853, *Typhis cumingii* W. J. Broderip, 1833, *Conus cumingii* L. A. Reeve, 1848, *Cribrarula cumingii* (Sowerby, 1832), *Thyasira cumingii*



Fischer, 1861, *Musculus cumingiana* L. A. Reeve, 1857, *Neoferdina cumingi* (Gray), *Balanophyllia cumingii* Milne Edwards & Haime, 1848, *Truncatoflabellum cumingii* (Milne Edwards & Haime, 1848)]. Более подробная статья о Хьюге Куминге В. Ершова опубликована на сайте Клуба коллекционеров.

cylindrica (Born 1778) *Erronea* – цилиндрическая, ссылается на цилиндрическую форму раковины.

Синонимы

caledonica (вариация или форма *lynx*) - Из Новой Каледонии (так же формы *bistrinotata*, *langfordi*, *mariae*, *teramachi*, *teres*)

callosa (синоним *erosa*) Hidalgo, 1907) - солидная, толстокожая

calxequina (ssp. *mauritiana*) Название не ясно

camelorum (син. или ф. *annulus*) Похожая на верблюда

canaliculata (синоним *arabica*) Roeding - имеющая отчетливую борозду

cancellata (синоним *helvola*) Gmelin, 1791 - Cancellatus = решетчатый, распертый перекладинами.

catulus (f. *pantherina*) - подобная котенку. В «Латинско-русском словаре» *catulus* – детеныш, преим. котенок, щенок.

D:

dama (подвид *vitellus* Perry 1811) *Lyncina* – дикая коза, серна.

dampierensis (подвид *hammondae* Sch. & Cernoh. 1965) *Purpuradusta*– из района Дампьера (архипелага или полуострова).

dancalica (подвид. *lentiginosa* Jonklaas & Nicolay 1977) *Palmadusta* - из района побережья Данкали, Красное море.

dani (форма *dayritiana* Beals 2002) *Eclogavena* – предположу, что в честь Дональда Дана (Donald Hongfok Yin **Dan**, 1938), американского дилера. *Favartia dondani* S. Kosuge, 1984, *Pterynotus dondani* S. Kosuge, 1984, *Conus dondani* S. Kosuge, 1981, *Crenavolva dondani* (Cate, 1964) and *Homalocantha dondani* D' Attilio & S. Kosuge, 1989 (с сайта femorale.com.br)

или **Виктора Дана** (Mr. Victor **Dan**) из Марилы, конхиолога.- любителя



dauphinensis (подвид *citrina* Lorenz, 2002) *Erosaria*- из форта Дофин (Мадагаскар).

dayritiana (Cate 1963) *Blasicrura* – в честь Фернандо Дайрита (Mr. Fernando G. Dayrit), коллекционера и дилера с Филиппин, куратора отдела Малакологии Национального музея Филиппин. Также названы: *Erronea fernadoi* Cate, 1969, *Conus dayriti* D. Röckel & A. J. da Motta, 1983, *Paralbunea dayriti* (Serène & Umali, 1965)].



FERNANDO DAYRIT



debruini (подвид *coronata* Lorenz 2002) *Cypraeovula* – в честь малаколога и дилера Бруно де Бруина из Намибии. Фото на Парижском Шелл-шоу. (с сайта femorale.com.br)



deceptor (подвид *brevidentata* (Iredale 1935) *Bistolida* – обманчивая *brevidentata*.

decipiens (Smith 1880) *Zoila* – обманчивая, вводящая в заблуждение.

deforgessi (Lorenz 2002 *Austrasiatica* – в честь доктора Бернарда Ричера де Форгес(з)а (Dr. Bertrand Richer de Forges, 1948-), из Парижского Национального музея истории природы.



Он известен как организатор многих экспедиций по морской тематике в Новую Каледонию и Юго-Западную часть Тихого океана и как коллекционер многочисленных «новинок» в каждой группе морских животных. В честь него также названы:

[*Seguenzia richeri* B.A. Marshall, 1991, *Diacanthurus richeri* McLaughlin & Forest, 1997, *Pseudosquilla richeri* Moosa, 1991, *Calliostoma (Fautor) richeri* B.A. Marshall, 1995, *Leptotrophon richeri* Houart, 1995, *Mathilda richeri* Bieler, 1995, *Xeinostoma richeri* Tavares, 1993, *Hermes richeri* (Richard & Moolenbeek, 1988), *Trischizostoma richeri* Lowry & Stoddart, 1994, *Nassarius (Zeuxis) richeri* Cernohorsky,

1992, *Pterynotus (Pterynotus) richeri* Houard, 1991, *Metapenaeopsis richeri* Crosnier, 1991 *Gymnocrinus richeri* Bourseau, Ameziane-Cominardi & Roux, 1987, *Eumitra richeri* Lozouet, 1991, *Notoplax (Notoplax) richeri* Kaas, 1990, *Gebiacantha richeri* Ngoc, 1989, *Lithodes richeri* Macpherson, 1990, *Parastylodactylus richeri* Cleva, 1990, *Periclimenes richeri* A.J. Bruce, 1990, *Archidistoma richeri* F. Monniot, 1988, *Amalda hilgendorfi richeri* Kilburn & Bouchet, 1988, *Polycarpa richeri* C. Monniot, 1987, *Pterynotus (Pterynotus) richeri* Houart, 1987, *Clanculus richeri* Vilvens, 2000, *Lioconcha richerdeforgesi* Lamprell & Stanisic, 1996, *Alvania richeri* Gofas, 1999, *Perotrochus deforgesi* Métivier, 1990, *Dentalium deforgesi* Scarabino, 1995, *Paracanthosis richerdeforgesi* (Bayer & Stefani, 1987), *Cranaothus deforgesi* Ng, 1993, *Nematocarcinus richeri* Burukovskii, 2000, *Synchiropus richeri* Fricke, 2000, *Parapagurus richeri* Lemaitre, 1999, *Propeamussium richeri* Dijkstra, 2001, *Phyllidiopsis richeri* Valdés, 2001, *Leptochiton deforgesi* Sirenko, 2001, *Spondylus deforgesi* Lamprell & Healy, 2001,

Hydroginella richeri Boyer, 2001, Oreotlos bertrandi Tan & Ng, 1995, Cirsotrema (Dannevigena) richeri E.F. Garcia, 2003, Dromidiopsis richeri McLay, 2001, Periclimenes forgesi X. Li & A.J. Bruce, 2006]. (Dr. Métivier, at the MNHN, Paris, kindly provided some of this information and Dr. A.J. Bruce kindly provided the last eponym)

delicatura (подвид *eludens* (Raybaudi 1991) *Zoila* – деликатная *eludens*.

depressa (Gray 1824) *Mauritia* – сдавленная, угнетенная.

deprestieri (подвид *kieneri* (Schilder, 1933) *Bistolida* – названа в честь В.Ф. де'Престера (Dr. W.F. de Priester, 18??-19??), голландского физика и коллекционера раковин.

descripta (форма *staphylaea consobrina* Iredale 1935) *Staphylaea* – с упорядоченной окраской.

diauges (Melvill, J.C., 1888) – просвечивающая, полупрозрачная. (Translucent Stolidia)

diluculum (Reeve, L.A., 1845) – предрассветная пора, утренние сумерки.

dillwini (Schilder 1922) *Cryptocypraea* – в честь Льюиса Вестона Диллвина (Lewis Weston Dillwyn, 1778-1855 (31 Aug. - Swansea, Wales), специалиста по фарфоровым изделиям и малаколога-любителя. В честь семьи Диллвинов назван город в США, куда в 1682 они иммигрировали. Его старший брат Джон Диллвин Левелин (John Dillwyn Llewelyn)- пионер фотографии.



dispersa (подвид *depressa* Sch. & Sch.) *Mauritia* – рассыпанная, разбросанная.

distans (подвид *contaminata* Schilder & Schilder 1938) *Palmadusta* – растянутая, протяженная (возможно удаленная).

donmoorei (подвид *mus* Petuch 1979) *Muracypraea* – в честь доктора Дон Мури (Dr. Don Moore) из университета Майами. Дональд Ричард Мури (Donald Richard Moore, (16 Feb. - West Palm Beach, Florida) 1921-97 (19 Oct.), малаколог из Соединенных Штатов Морской лаборатории Университета Майами. Также названы: *Murex donmoorei* Bullis, 1964, *Weedingia mooreana* Kaas, 1988, *Olivella moorei* Abbott, 1951].

dorsalis (подвид *subviridis* Schilder & Schilder 1938) *Erronea* – с дорсальным пятном.

dracaena (подвид *caurica* Born, I. von, 1778) *Erronea* - драконья ципрея (Dragon Caurica).

durbanensis (подвид *fimbriata* (Schilder, F.A. & M. Schilder, 1938) *Purpuradusta* - из порта Дурбан Южная Африка.

E:

eburnea (Barnes 1824) *Erosaria* – цвета слоновой кости, (перен.) блистающий,

ослепительный. Ф. Лоренц в «Монографии...» для *thersites eburnea* приводит как белый *thersites*.

eburnea (форма *thersites* Raybaudi 1985) *Zoila* – белый *thersites*.

edentula (Gray 1825) *Cypraeovula* – беззубая.

edingeri (форма *rosselli* Raybaudi 1990) *Zoila* – в честь австралийского коллекционера и дайвера Эндрю Эдингера. На фото Э. Эдигер и его коллекция раковин (фото с сайта Валерия Даркина www.alfadarkin.com/).



eglanthina (Duclos 1833) *Mauritia* – (греч.) дикая роза (или по мнению Ф. Шилдера – возможна опечатка для *eleganthina* – изящная, элегантная).


elizabethensis (форма *capensis* Rous 1905) – из порта Элизабет, Южная Африка.

elongata (подвид *caurica* Perry 1811) *Erronea* – вытянутая, продолговатая.

eludens (Raybaudi 1991) *Zoila* – уклончивая, ускользающая.

eluceta (форма *mappa viridis* Lorenz & Hubert, 2000) *Leporicyprea* – сияющая, блистательная, яркая.

englerti (Summers & Burgess, 1965) – в честь отца Энглерта (Father Sebastian Englert), 1888-1969, немецкого католического миссионера из Баварии, проживавшего на Восточном острове (Easter Island) Rapa-nui. На фото справа.



episema (подвид *venusta*) *Zoila* – официальная *venusta*. (по мнению Э. Хеймана - Великолепная, нерядовая, выдающаяся).

erosa (Linnaeus 1758) *Erosaria* – разъеденная ципрея.

errones (Linnaeus 1758) *Erronea*- ошибочная (первоначально принятая за *stolidus*). По мнению Ф. Шилдера возможна опечатка *erronea*.

erythraensis (Sowerby 1837) *Bistolida* – из Эритреи, Красного моря.

esontropia (Duclos 1833) *Cribrarula* – килеватая, килеобразная (с килем). Относится к к острой кромке, сформированной колумеллярными зубами.

euclia (форма *pulicaria* Steadman & Cotton 1946) *Notocypraea* – из района Юклы (Eucla) Южная Австралия.

eunota (синоним) - с прочным, твердым, сплошным дорсумом (более вероятно, по мнению Шилдера, плохо составленное *eu* –хорошо, *notus* – известный).

exmouthensis (Lorenz 2002) *Cribrarula* – из залива Эксмаут Западная Австралия

exusta (Sowerby 1832) *Talparia* – сожженная, опаленная

F:

fabula (подвид *felina* (Kiener 1843) *Melicerona* – напоминающая по виду боб.

facifer (подвид *limacina* (Iredale 1935) *Staphylaea* – красивая *limacina*.

fallax (Smith 1881) *Cribrarula* – обманчивая, лживая.

fainzilberi (форма *lamarckii lamarckii* Lorenz & Hubert 1993) *Erosaria* – В честь коллекционера из Танзании М.Файнзильбера..

felina (Gmelin 1791) *Melicerona* – кошачья.

fernandoi Cate 1969 *Erronea* – в честь Фернандо Дайрита (Mr. Fernando G. Dayrit) коллекционера и дилера с Филиппин. [*Blasicrura dayritiana* (Cate, 1963), *Conus dayriti* D.

fimbriata (Gmelin 1791) *Purpuradusta* – с бахромчатым краем.

fluctuans (подвид *brevidentata* (Iredale 1935) *Bistolida* – колеблющаяся, неустойчивая.

francescoi (подвид *esontropia* Lorenz 2002) *Cribrarula* – в честь Франческо Чаппони (Francesco Chiapponi).

francisca (подвид *hirundo* Schilder & Schilder 1938) *Bistolida* – в честь дочери Ф.А.и М. Шилдер – Франциски (Francisca).

friendii (Gray 1831) *Zoila* – в честь капитана Фрэнда (Capt. **Friend**, F.R.S.- Королевского общества (содействия развитию естествознания), добывшим первый экземпляр раковины.

fultoni (Sowerby 1903) *Varycupraea*- в честь Хьюга Фултона (Hugh Coomber Fulton, 1861-1942). Наиболее хорошо коллекционерам известна *Cupraea fultoni* Sowerby, 1903, сейчас перемещенная в род *Varycupraea* Schilder, Малаколог-любитель, описавший несколько таксонов моллюсков, а также дилер, опубликовавший прайс-лист продающихся раковин совместно с последним представителем династии Соуверби. [*Chronos fultoni* Coen, 1922, *Pulsarella fultoni* (Sowerby, 1888), *Volachlamys fultoni* Sowerby, 1904, *Mesophaedusa fultoni* (Sykes, 1895), *Cardium fultoni* Sowerby, G.B., 1916, *Mitra fultoni* E.A. Smith, 1892, *Conus fultoni* G. B. Sowerby III, 1887, *Chlamys fultoni* Sowerby, 1904, likely *Trivirostra fultoni* Cate, 1979, *Acila fultoni* E. A. Smith, 1892].

fuscodentata (Gray 1825) *Cupraevovula* – с темными зубами.

fuscomaculata (подвид *goodallii* (Pease 1865) *Bistolida* - с темным пятном (пятнами).

fuscorubra (Shaw 1909) *Cupraevovula*- темно-красная, темно-коричневая.

Синонимы:

fisheri - В честь П.М.Х.Фишера (1865-1916), французского малаколога

G:

gabriellii (подвид *coronata* Lorenz 1993) *Cypraeovula* – в честь Людвиг Габриэлли (Ludwig **Gabrielli**) коллекционера и эксперта по ципреям из Ньюса (Neuss).

gambiensis (форма *zonarias* Shaw 1909) *Zonaria* – из Гамбии, Африка.


gangranosa (Dillwyn 1817) *Erosaria* – гангренозная. (красные окончания раковины вызвали у автора ассоциацию с гангренгой).

ganteri (подвид *cribraria* Lorenz 1998) *Cribrarula* – в честь доктора Херберта Гантера (Dr. Herbert Ganter), германского коллекционера, открывшего подвид.

garciai (Lorenz & Raines 2000) *Cribrarula* – в честь Михаэля Гарсиа, обнаружившего первую раковину вида.

garretti (форма *quadrinaculata thielei* (Schilder & Schilder 1938) *Eclogavena* – нет данных.

gaskoinii (Reeve, 1846), *Cribrarula* – в честь Джона Самуэля Гаскойна (John Samuel **Gaskoin**, (29? Sep.) 1790-1858 (5 Oct.), английский (лондонский) хирург, малаколог и владелец Шелл-кабинета, [*Anachis gaskoini* Carpenter, 1857]. На фото справа (фото из книги Барри Вильсона).



gaspardi (Biraghi & Nicolay 1993) *Cribrarula* – в честь Алана Гаспарда (Alain Gaspard), дилера из Люксембурга.

geographica (Sch. & Sch. 1933) *Leporicypraea* – географическая. (рисунок дорсальной поверхности напоминает географическую карту).

gibba (форма *arabica asiatica* Coen 1949) *Mauritia* – горб.

giftunensis (подвид *globulus* Lorenz 1992) *Pustularia*- с рифов Гифтун, Хургада, Египет

gilvella (Lorenz 2002) *Luria* – светло-желтая, янтарная.

globulus (Linnaeus 1758) *Pustularia* – шарик.

gondwanalandensis (подвид *fuscrobra* (Burgess 1970) *Cypraeovula* – по названию существовавшего на ранней стадии развития Земли материка – Гондваны.

gonubiensis (подвид *capensis* Massier 1994) *Cypraeovula* – из Гонуби, около Восточного Лондона, Ю.Африка.

goodalli (Sowerby, 1832), *Bistolida* – в честь британского малаколога Джозефа Гудала (Sir Joseph **Goodall**, 1760-1840), также в его честь названы *Chiton goodallii* W. J. Broderip, 1832, род *Goodallia* Turton, 1822, и около 12 видов, носящих его имя. *Mangelia goodallii* Reeve, 1846, *Azeca goodalli*, *Marginella goodalli* и т.д.



gorda (подвид *capensis* Van Heesvelde & Deprez 2006) *Cypraeovula* – полная, тучная женщина (название испанского происхождения).

gracilis (Gaskoin 1849) *Purpuradusta* – тонкий, стройный, нежный. Название было дано по очень красивому голотипу, чего не скажешь о рядовых экземплярах.

granulata (Pease 1862) *Nucleolaria* – покрытая зернышками, бугорками.

gravida (Moretzsohn 2002) *Cribrarula* – наполненная, тяжелая (может быть – беременная).

grayana (Schilder 1930) *Mauritia* - в честь Джона Эдварда Грэя (John Edward Gray, (12 Feb. - Walsall, Staffordshire) 1800-1875 (7 Mar. - London), английского зоолога, одной из наиболее заметных фигур в начальной истории Британского музея. [*Neoamphitrite grayi* (Malmgren, 1866), *Assiminea grayana* Leach, 1817, *Grayella* Carter, 1869, *Mesoplodon grayi* (von Haast, 1876), *Echinomermella grayi* (Gemmill, 1901), *Grayax* De Laubenfels, 1986, *Prianos grayi* Hechtel, 1983, *Reniera grayi* Du Bocage, 1869, *Teichaxinella grayi* Wells et al., 1960, *Thenea grayi* Sollas, 1886, *Austropandalus grayi* (Cunningham, 1871), *Chorioplax grayi* H. Adams & G. F. Angas, 1864, *Paramuricea grayi* (Johnson, 1861), *Endopachys grayi* Milne Edwards & Haime, 1848, *Sinum grayi* (Deshayes, 1843), *Terebra grayi* E.A. Smith, 1877, *Natica grayi* R. A. Philippi, 1852, *Conus grayi* L. A. Reeve, 1844, *Bursa grayana* (Dunker, 1862), *Mytilus grayanus* R. W. Dunker, 1853, *Caryophyllia grayi* (Milne Edwards & Haime, 1848), possibly *Amoria grayi* Ludbrook, 1953, *Paguristes grayi* Benedict, 1901, likely *Eleutherobia grayi* Thomson & Dean, 1931, likely *Sinularia grayi* Tixier-Dureivault, 1945].



grohorum (подвид *fuscodentata* Lorenz 2002) *Cypraeovula* – в честь Клауса и Кристины Грох (Mrs. Christina **Groh**, Klaus **Groh**, 1936) – малакологии и владельцы Интернет-магазина «ConchBooks». *Conus grohi* Tenorio & Poppe, 2004 *Guerrina christinae* Valido, Groh, Ibanez & Alonzo, 1993.

На фото слева. (фото с сайта ConchBooks).

guidoi (подвид *katsuae* Lorenz 2002) *Palmulacypraea* – в честь Гвидо Поупа, бельгийско-филиппинского малаколога.

На фото справа: Г. Поуп (фото с сайта «conchology.be»).

guttata (Gmelin 1791) *Perisserosa* – пятнистая, пестрая.



H:

hammondae (Iredale, 1939) *Purpuradusta* – в честь мисс Хаммонд (Mrs **Hammond**, коллекционера из Австралии).

hartsmithi (Schilder, 1967) *Notocypraea* – в честь В. Хартсмита (Mr. W. **Hart-Smith**), из Сиднея, обнаружившего раковину.

hawaiiensis (подвид **helvola** (Melvill 1888) *Erosaria* – гавайская, с Гавайских островов.


helvola (Linnaeus 1758) *Erosaria* – изжелта-розовая, медовая.

hesitata (Iredale 1916) *Umbilia* – нерешительная, колеблющаяся.

hesperina (подвид **coxeni** Schilder & Summers 1963) *Eclogavena* – западная.

hilda (форма **gracilis macula** Iredale 1939) *Purpuradusta* – нет данных

hirasei (Roberts, 1913) *Nesioocypraea* – в честь японского коллекционера и дилера Йоширо Хирасе (Yoichiro **Hirase**, 1859-1925), основателя конхиологического музея в Киото. [*Voluta hirasei* G.B. Sowerby, 1912, *Limaria hirasei* (Pilsbry, 1901), *Natica hirasei* H. A. Pilsbry, 1905, *Haustellum hirasei* Dautzenberg in Hirase, 1915, *Glans hirasei* Dall, 1918, *Nesioocypraea hirasei* (Roberts, 1913)]. Был основателем «Конхиологического журнала».



hirundo (Linnaeus 1758) *Bistolida* – ласточка

histrion (Gmelin 1791) *Mauritia* – шут.

howelli (форма **hesitata** Iredale 1931) *Umbilia* – нет данных.

humphreysii (Gray 1825) *Palmadusta* - в честь Джона Хампрейс (John D. **Humphreys**, 1775-1864), конхиолога с острова Корк (Cork, Ireland) [*Epitonium humphreysi* (Kiener, 1838)].

hungerfordi (Sowerby, 1888) *Erronea* - в честь Ричарда Хангерфорда (Dr. Richard **Hungerford**).

hypermarginata (форма **ketyana** Raybaudi 1993) *Zoila* – **ketyana** с гиперразвитыми краями (боками).

I:

icterina (форма **moneta** Lamarck 1810) – желтая, желтушная.

immaculata (форма **coronata debuini** Raybaudi 1986) *Cypraeovula* – незапятнанная.

immanis (вид по Ф. Лоренцу, но мне больше нравится подвид **arabica** Schilder & Schilder 1939) *Mauritia* - необыкновенно большая, огромная.

immelmani (Liltved 2001) *Cypraeovula* - в честь Вилли Иммельмана (Willie **Immelman**), коллекционера из Джефрис Бэй (Jeffreys Bay) Южная Африка.

imperialis (форма *talpa* Schilder & Schilder) *Talparia* – императорская.

indica (подвид *scurra* Gmelin 1791) *Mauritia* – индийская *scurra*.

ingens (форма *testudinaria* Schilder & Schilder 1938) *Chelycypraea* – огромная.

inopinata (подвид *achatidea* Schilder 1930) *Schilderia* – неожиданная.

insulicola (форма *pallida* Sch.& Sch. 1938) *Erronea* – нет данных.

interrupta (Gray 1824) *Blasicrura* – (с) прерывающимися зонами.

interstincta (подвид *limacina* (Wood 1828) *Staphylaea* - предположительно – разобренная, разделенная.

irrorata (Gray 1828) *Erosaria* – покрытая росой.

isabella (Linnaeus 1758) *Luria* – получила свое название за грязно-розовый цвет, «кулер Изабель», который произошел из предания о королеве Изабелле (доподлинно не известно которой именно- Изабелле Испанской или штатгальтерши нидерландской). Она дала обет не мыться и не менять платья пока ее супруг не вернется из военного похода.

isabellamexicana (Stearns 1893) *Luria* – мексиканская *isabella*

iutsui (Shikama, 1974) *Cypraeovula* – в честь Чена И-Тсу (Mr. **Iu-tsu** Chen) с Тайваня.



Синонимы:

insulata (вар. *friendii*) – островная, ставшая островом. Доктор Хейман считает – изолированная. Последнее название больше соответствует среде обитания моллюска.

iredalei (син. *punctata* Sch.& Sch. 1938) *Notadusta* – в честь Тома Иредайла (Tom **Iredale**, 1880-1972). Английский орнитолог и конхиолог, работавший в Британском музее. Почти год провел на Kermadec Island. Там началось его увлечение конхиологией. В 1923 г. он переселился в Австралию и в 1942-44 г. работал в Австралийском музее, Сидней. [*Cryptoplax iredalei* E. Ashby, 1923, *Murexiella iredalei* W. F. Ponder, 1972, *Strombus iredalei* Abbott, 1960, *Mareleptopoma iredalei* (Bavay, 1921)].



J:

jamila (форма *gracilis notata* Lorenz & Hubert, 1993) *Purpuradusta* – нет данных.



janae (подвид *teres* Lorenz 2002 *Talostolida* – в честь Яны Кратч (Jana Kratzsch).

На фото слева. (фото с сайта Ф.Лоренца <http://www.cowries.info>)

jandeprezi (форма *bistrinotata* Poppe & Martin, 1997)


Pustularia – в честь Яна Депреза, бельгийского дантиста и выдающегося коллекционера ципрей.

japonica (форма *gracilis gracilis* Schilder 1931) *Purpuradusta* – японская.

jeaniana (Cate 1968) *Zoila* – в честь малаколога и жены К. Катэ Джейн (Jean Cate).

Фото из книги Барри Вильсона.

johnsonorum Lorenz 2002 *Palmadusta* – в честь Джанет и Скотта Джонсон (Jeanette & Scott Jonson) Kwajalein, обнаруживших подвид.



joycae (Clover 1970) *Lyncina* – в честь Джойс Кlover (Joyce Clover, жены автора описания раковины.

К:

katsuae (Kuroda 1960) *Palmulacypuraea* – в честь жены японского малаколога Акибуми Терамаши (Akibumi Teramachi) Катсу (Katsu Teramachi).



keelingensis (*bistrinotata* Schilder & Schilder 1940)

Pustularia – из района Кокосовых островов. **Кокосовые Острова (Cocos Islands and Keeling Islands)**, известные также как **Острова Килинг** и являющиеся владением Австралии, представляют собой группу из 27 коралловых островов, расположенных в восточной части Индийского Океана, посередине между Шри Ланка и Австралией. Статью об «втором открытии» этого

подвида можно прочитать на сайте Ф.Лоренца или в русском переводе А.Ивлиева на сайте Шелл-клуба.


kenyonae (форма *caputserpentis caputserpentis* (Schilder & Schilder, 1938) *Monetaria* - в честь коллекционера из Австралии Агнес Ф. Кенъон (Mrs. Agnes F. Kenyon), опубликовавшей работы о моллюсках Виктории (Австралия), [*Voluta kenyoniana* Brazier, 1897, *Axinaea kenyoniana* Brazier, 1897].

kesslerorum (Lorenz 2006) *Сурпаеовула* – в честь Элфрид и доктора Ханца Конрада Кесслера (Elfriede and Hans Conrad Kessler) из Zumicon Швейцария.

ketyana (Raybaudi 1978) *Zoila* – в честь Кети Николаи (Kety Nicolay), малаколога и издателя журнала "La Conchiglia". Фото справа.

См. также фото в разделе «А».





kieneri (Hidalgo 1906) *Bistolida* - Louis-Charles **Kiener**, 1799-1881, французский куратор коллекции натуральной истории барона Делессерта (Delessert) в Лионе, и писателя на темы малокологии [*Murexsul kieneri* L. A. Reeve, 1845, *Thais kieneri* G. P. Deshayes, 1844, *Cypraea kieneri*].

kingae (форма *bernardi* Rehder & Wilson, 1975) *Erosaria* – в честь Мэриэл Кинг (Mary Eleanore **King**). Раковина была поднята драгой в 1967 года во время экспедиции исследовательского судна «Пеле» («Pele») недалеко от острова Питкайрн (Pitcairn Isl.), спонсором которой была Мэриэл Кинг. Статью о Мэриэл Кинг можно прочитать в “HSN” № 4 1962 г.



Mariel King assisted by Bobby Lee sorts through coral rubble dredged from deep water

kuroharai (Kuroda & Habe 1961) *Lyncina* – в честь японского малаколога Казуо Курохара (Kazuо **Kurohara**), также названы: *Homalocantha kuroharai* T. Habe, 1970, *Conus kuroharai* T. Habe, 1965, *Solamen kuroharai* T. Habe, 1961,

kwajaleinensis (подвид *stolida* (Martin & Senders 1983) *Bistolida* – из района атолла Кваджалейн (Меланезия)


L:

labrolineata (Gaskoin 1849) *Erosaria* – с линиями (каштановыми) на губе.

lactescens (форма *erosa chlorizans* (Dautzenberg & Bouge, 1933) *Erosaria* – молочного цвета.

laevigata (подвид *staphylaea* (Dautzenberg 1932) *Staphylaea* – гладкая, разглаженная.

lamarckii (Gray 1825) *Erosaria* – в честь Жана Батиста Пьера Антоне де Моне (иногда де Друэ) де Ламарка. Обычно называют шевалье де Ламарк (Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet (or sometimes de Drouet) **de Lamarck**, usually called Chevalier de Lamarck, (1 Aug.)



1744-1828 (18 Dec.), французский естествоиспытатель, предшественник Ч.Дарвина. Создал учение об эволюции живой природы. Основоположник зоопсихологии. В его честь также названы:

[*Cyanea lamarcki* Péron & Lesueur, 1809, *Aulorrhiza lamarcki* (Haeckel, 1869), *Cerastoderma lamarcki* Reeve, 1844, *Hyattella lamarcki* Topsent, 1933, *Leucosolenia lamarckii* Haeckel, 1869, *Pomatoceros lamarcki* (de Quatrefages, 1866), *Gorgonocephalus lamarckii* (J. Müller & Troschel, 1842), *Gyroidina lamarckiana* (d'Orbigny, 1839), *Gyroidinoides lamarckiana* (d'Orbigny, 1839), *Quinqueloculina lamarckiana* d'Orbigny, 1826, *Olencira lamarckii* Leach, 1818, *Carinaria lamarcki* Péron & Lesueur, 1810,

Eunaticina lamarckiana Récluz, *Conus lamarckii* L. C. Kiener, 1849, *Cypraea lamarcki* Gray, 1825, *Solen lamarckii* G. P. Deshayes, 1839, *Petrolisthes lamarckii* (Leach, 1820), *Mycetophyllia lamarckiana* Milne Edwards & Haime, 1848, *Agaricia lamarcki* Milne Edwards & Haime, 1851, *Erosaria lamarckii* (Gray, 1825), *Lobophytum lamarcki* Tixier-Durivault, 1956].

langfordi (Kuroda 1938) *Austrasiatica* – в честь Даниэля Б. Лангфорда из Иокогамы (Daniel B. Langford) похоже, что в честь него также названа (*Fustiaria langfordi* (T. Habe, 1963)

lani (подвид *tessellata* (Raybaudi 1986) *Luria* – возможно в честь известного малаколога из Тайваня Т. Лана (T.C. Lan) (Taipeh, Taiwan.)
На фото справа. Фото из «HSN» 1974 – 8.



latebrosa (подвид *castanea* Swarts & Liltved 2000) *Cypraeovula* – возможно хорошо укрытая, имеющая много укрытых мест, или пористая.

latior (Melvill 1888) *Talostolida* - более широкая, широчайшая;

latistoma (подвид *rosselli* Lorenz 2002) *Zoila* – скорее всего – с широкими зубами, но Ф.Лоренц в оригинальном описании приводит англоязычное название –“ wide-mouthed rosselli” - с широким ртом, ширококоротая.

lefaiti astaryi astaryi Schilder 1971 Martin & *Cribrarula* – нет сведений.

leforti (подвид *cernica* (Senders & Martin 1987) *Erosaria* – в честь Жана Поля Лефорта (Mr. Jean Paul Lefort, (15 May - Bayonne, France) 1948-) с 1970 г живущего на острове Маева, Huahine Французская Полинезия, он директор школы и исследователь-любитель морских раковин, также назван (*Vexillum (Costellaria) leforti* Turner & Salisbury, 1999. Фото с сайта В.Даркина - www.alfadarkin.com/



lenella (подвид *cylindrica* (Iredale 1939) *Erronea* – нет данных.

lentiginosa (Gray 1825) *Palmadusta* – в веснушках, веснушчатая,

leucodon (Broderip 1828) *Lyncina* - с белыми зубами;

leviathan (Schilder & Schilder 1937) *Lyncina* – в библейской мифологии – огромное морское чудовище, в переносном смысле – нечто огромное и чудовищное,

levissima (подвид *iutsui* (Raybaudi 1995) *Cypraeovula* – очень легкая, или очень гладкая????

lienardi (форма *cicercula* Jousseaume 1874) *Pustularia* – нет данных.

limacina (Lamarck 1810) *Staphylaea* – подобная слизняку.

lisetae (Kilburn 1975) *Nesiocypraea* – в честь жены С.Р. **Fernandes** из Lourenço Marques (=Maputu), первым обнаружившего раковину - Лизет Фернандес (**Lisete Fernandes**);



listeri (Gray 1824) *Melicerona* – в честь Мартина Листера, английского физика и натуралиста. [*Strombus listeri* Gray, 1852, *Perophora listeri* Wi egman, 1835, *Diodora listeri* (d'Orbigny, 1842), *Tellina listeri* Röding, 1798, *Periglypta listeri* (Gray, 1838), *Erronea listeri* (Gray, 1824), possibly *Astreopora listeri* Bernard, 1896, possibly *Acropora listeri* (Brook, 1893)].



longinqua (форма или вариация *achatidea* Schilder & Schilder 1938) *Schilderia* – отдаленная, далекая.

longior (форма *caurica* Iredale 1935) *Erronea* – длинная, вытянутая,

lovetha (форма *hungerfordi bealsi* Poppe et al. 2005)

"*Notadusta*" -

luchuana (Kuroda 1960) *Eclogavena* – от названия островов Lu-chu (Ryu-kyu);

lurida (Linnaeus 1758) *Luria* – изжелта-бледная, бледно-желтая,

lutea (форма *ketyana* Raybaudi 1993) *Zoila* – золотисто-желтая (шафранного цвета),

lutea (Gmelin 1791) *Palmadusta* - золотисто-желтая (шафранного цвета),

lynx (Linnaeus 1758) *Lyncina* – рысь.

Синонимы

lekalekana (синоним *gilvella* Ladd, H.S., 1934) *Luria* –

lemurica (синоним *childreni* Schilder, F.A. & M. Schilder, 1938) *Ipsa* -

leucostoma (синоним *teulerei* Gmelin, J.F., 1791) – белозубая, с белыми зубами.

latefasciata (синоним *asellus* Schilder, 1930) *Palmadusta* – с широкими полосами, повязками. Ф.А. Шилдер отнес это название для раковин юго-восточной Австралии. Употребляется для раковин, имеющих широкие белые полосы.

lima (синоним *nucleus nucleus* Röding, P.F., 1798) *Nucleolaria* –

lilacina (синоним *limacina* Weinkauff, H.C., 1881) *Staphylaea* -

