

M:

macandrewi (G.B. Sowerby, 1870)]. *Erosaria* – в честь сэра Роберта МакАндрю, эсквайра (Sir Robert MacAndrew, Esq., 1802-73), предпринимателя и конхиолога из Ливерпуля.

macula (подвид *gracilis* (Angas 1867) *Purpuradusta* – с пятном.

maculifera (Schilder 1932) *Mauritia* – согласно Ф.А. Шилдеру – несущая пятно на внутренней губе.

madagascariensis (форма *nucleus* (Linnaeus 1758) *Nucleolaria* – мадагаскарская, из района острова Мадагаскар,

magnifica (подвид *diluculum* Coen 1949) *Palmadusta* – великолепный, роскошный,

magnifica (подвид *exmouthensis* Lorenz 2002) *Cribrarula* – великолепный, роскошный,

mappa (Linnaeus 1758) *Leporicypraea* – карта, с рисунком дорсальной поверхности, напоминающим географическую карту,

margarita (Dillwyn 1817) *Pustularia* – жемчуг, жемчужина.

marginalis (Dillwyn 1827) *Erosaria*- окаймленная.

marginata (Gaskoin 1849) *Zoila* - окаймленная.

mariae (Schilder 1927) *Annepona* – в честь доктора Марии Шилдер (Dr. Maria Schilder (née Hertrich), (4 Aug.) 1898-1975 (30 July) малаколога, жены Ф.А. Шилдера,



maricola (форма *lisetae* Cate 1976) *Nesiocypraea* - возникло из комбинации двух латинских слов: mare и solus = обитающая в море.

mariellae (Raybaudi 1983) *Zoila* – в честь жены Л. Райубауди Массилиа – Марии.
фото из статьи А. Ивлиева о *Zoila mariellae*.



marina (подвид *friendii* Kostin 2005) *Zoila* – в честь жены А. Костина – Марины.

marquesana (подвид *fimbriata* Lorenz 2002) *Purpuradusta* – с Маркизских островов,

martini (Schepman, 1907) *Notadusta* – вероятно в честь голландского\немецкого геолога и палеонтолога проф. Мартина (Prof. J.K.L. Martin, 1851-1942), работавшего в Риксмuseum, Лейден (Rijksmuseum, Leiden). *Modiolus martini* M. M. Schepman 1891

martybealsi (подвид *maculifera* Lorenz 2002) *Mauritia* – в честь американского коллекционера и дайвера Марти Билса (Marty Beals), обнаружившего подвид.

На фото: М. Билс (слева) и В. Даркин. (фото с сайта В.Даркина <http://www.alfadarkin.com>),



massieri (форма *fultoni amorimi* Lorenz, 1991) *Barycypraea* в честь Вернера Массиера (Werner Massier), южно-африканского дилера и коллекционера.

mauiensis (Burgess 1967) *Pustularia* – из района острова Мауи, второго по величине из Гавайских островов.

mauritiana (Linnaeus 1758) *Mauritia* – с острова Маврикий.

melocellata (*marginalis* Lorenz & Wiese 1990) *Erosaria* – по мнению доктора Л. Хеймана – цвета меда.

melvilli (подвид *listeri* (Hidalgo 1906) *Melicerona* – в честь Джеймса Космо Мелвила (James Cosmo [Melvill](#), 1845-1929), владельца большого шелл-кабинета. Большинство его раковин были куплены Томлином и в настоящее время хранятся в Национальном музее Уэльса. (National Museum of Wales) [*Micropleurotoma melvilli* Sykes, 1906, *Turbonilla melvilli* Dautzenberg, 1913, *Spirotropis melvilli* Sykes, 1906, *Polemicella melvilli*, *Cerithiopsis melvilli* Jay & Drivas, 2002, *Conus melvilli* Sowerby III 1879]. *Turbonilla michaelis* Melvill, 1910 названа в честь его сына Михаэля Эрнеста Мелвила ([Michael Ernest Melvill](#)).

Фото из свободной энциклопедии Википедия.



melwardi (Iredale 1930) *Cribrarula* – в честь Мельбурна Уорда (Melbourne Word), малаколога из Австралийского музея, Сидней.

merguina (форма *asiatica* Lorenz & Hubert, 1993) *Mauritia* – из района полуострова Мергуи, Бирма (Mergui Peninsula, Burma),

meridionalis (подвид *helvola* Schilder & Schilder 1938 *Erosaria* - с юга (в этом случае с Ю.Африки); так же название форм многих видов

merista (*walkeri continens* Iredale 1939) *Contradusta* – Возможно, несмешанная

microdon (Gray 1828) *Purpuradusta* – с маленькими зубами,

midwayensis (Azuma & Kurohara 1967) *Nesiocypraea* – с атолла Мидуэй

mikeharti (Lorenz, 1985) *Cypraeovula* - в честь Майка Харта (Dr. Mike Hart), Южно- Африканского коллекционера, первым обнаружившего живого моллюска. На фото справа.

miliaris (Gmelin 1791) *Erosaria* – посыпанная просом,

minoridens (Melvill 1901) *Purpuradusta* – с меньшими зубами,

misella (подвид *ziczac* (Perry 1811) *Palmadusta* – бедненькая, слабенькая, ничтожная.

moneta (Linnaeus 1758) *Monetaria* – монета.

moretonensis (подвид *langfordi* Schilder 1965) *Austrasiatica* - из района мыса Моретон, Квинсленд, Австралия.

mountrouzieri (форма *mappa viridis* Dautzenberg 1903) *Leporicypraea* – в честь отца Ксавьера Монтрозье (Father Xavier Mountrouzier, 1820-97), пионера в изучении флоры и фауны Новой Каледонии во второй половине 19 столетия.

mus (Linnaeus 1758) *Muracypraea* – мышь.

musumea (Kuroda & Habe 1961) *Palmulacypraea* - нет данных (на сайте Э. Харди -Musume's Cowry???)

Синонимы:

mantellum (син. *mariae* Walls, J.G. & C.M. Burgess, 1980 – похожая на покрывало, плащ.

madagascariensis (синоним *granulata* Gmelin (1791) *Nucleolaria* – мадагаскарская, из района о. Мадагаскар. Много лет, *granulata* была известна как *Cypraea madagascariensis* Gmelin (1791). Несколько экземпляров были подарены Gmelin моряком в конце 1700-ых с ложными данными, что они привезены с Мадагаскара.



N:

nabequensis (форма *caurica quinquefasciata* (Heiman & Mienis, 1999) *Erronea* – из Набека, Египет (местность в 25-30 км. От Шарм-эль-Шейха). Здесь находятся самые северные мангровые леса в мире.

nahoonensis (подвид *edentula* Lorenz 1989) *Cypraeovula* - Из Нахуна, Восточный Лондон, Ю.Африка

namibiensis (подвид *algoensis* Massier 2006) *Cypraeovula* – из Намибии.

northi (форма *cribraria zadela* Steadm. & Cotton) *Cribrarula* – не данных.

notata (форма *gracilis* Gill 1858) *Purpuradusta* – видимая, заметная, отмеченная.

nashi (форма *labrolineata labrolineata* (Iredale 1931) *Erosaria* – в честь Нэша.

nebrates (Melvill 1888) *Erosaria* – шкура молодого оленя (которую носили вакханки во время празднеств Диониса, также считается - молодой олень.

nigropunctata (Gray 1828) *Pseudozonaria* – с черными (темными) пятнами.

nimbosa (форма *marginata albanensis* Raybaudi 1985) *Zoila* – облачная, покрытая облаками.

nivea (форма *turdus* Gray 1824) *Erosaria* – белоснежный.

nivosa (Broderip 1827) *Lyncina* – (с) белыми как снег (белоснежными) (пятнами).

nolani (подвид *staphylaea* Lorenz 1989) *Staphylaea* – в честь Нолана Вэбба (Nolan Webb 19??-88,) коллекционера из Южной Африки.

nucleus (Linnaeus 1758) *Nucleolaria* – ядро.

nymphae (Jay 1850) *Erronea* – нимфа.

nubilis (форма *obvelata obvelata* Sullioti 1924) *Monetaria* – достигший брачного возраста, взрослый, зрелый???

natalensis (подвид *pellucens* (Heiman 2002) *Talostolida* – из Наталя, Южная Африка.

nigromaculata (подвид *porteri* Lorenz 2002) *Lyncina* – с темными (черными) пятнами.

novaebritanniae (подвид *pulchella* Schilder & Schilder 1937) *Contradusta* – из Новой Британии

novaecaledoniae (форма или синоним *childreni* Schilder, F.A. & M. Schilder, 1952) *Ipsa* – из Новой Каледонии.

nugata (подвид *saulae* Iredale 1935) *Palmadusta* – предполагаю вздорная, пустая.

O:

obvelata (Lamarck 1810) *Monetaria* – окруженная парусом.

oceanica (подвид *lurida* Schilder 1930) *Luria* – океанская.

ocellata (Linnaeus 1758) *Erosaria* – со множественными глазами, глазчатая.

onyx (Linnaeus 1758) *Erronea* – оникс.

orientalis (Raybaudi 1985) *Zoila* - восточная

oriettae (Lorenz & Massiglia 2005) *Umbilia* – названа в честь Ориетты,

oryzaeformis (Lorenz & Sterba 1999) *Purpuradusta* – напоминающая по форме рисовое зерно (маленьким размером, цветом и формой) от латинского (oryza: рис)

ostergaardi (Dall 1921) *Erosaria* – в честь Дженса Матиаса Остергарда (Mr. Jens Mathias Ostergaard 1978-1969). Статья о Дженсе Остергарде опубликована в «HSNews» № 1 за 1995 год.



Jens Ostergaard & Ditlev Thaanum



Prof. Jens M. Ostergaard

ovum (Gmelin 1791) *Erronea* – яйцо.

owenii (Sowerby 1837) *Bistolida* – в честь Хьюга Овена (Hugh Owen вероятно Sir Hugh Owen, (14 Jan. - Anglesey) 1804-81 (20 No v. - Mentone, France) .

P:

palauensis (форма *ovum ovum* Sch. & Sch.) *Erronea* – с островов Республики Палау, Микронезия - островное государство в Филиппинском море, состоит примерно из 200 островов.

pallida (Gray 1824) *Erronea* – бледная, блеклая, выгоревшая от солнца.

pallidaeformis (форма *felina felina* Biraghi 1987) *Melicerona* – напоминающая по форме *pallida* (предположительно).

pallidula (Gaskoin 1849) *Blasicrura* – бледноватая, побледневшая.

panamensis *pellucens* (Lorenz 2002) *Talostolida* – Из Панамы, панамская.

panerythra (форма *mappa mappa* Melvill 1888) *Leporicyprea* – красного цвета.

pantherina (Solander 1786) *Cyprea* – пантеровая, окраской напоминающая пантеру (не слишком похожа, на мой взгляд, но рискну предположить, что голотип был очень темный, почти черный).

pardalina (форма *turdus turdus* Dunker 1852) *Erosaria* – леопардовая.

pardalis (форма *tigris* Shaw 1795) *Cyprea* – барс или леопард (Ф. Лоренц считает подвидом).

passerina (подвид *clandestina* (Melvill 1888) *Palmadusta* – маленький воробышек.

peelae (подвид *connelli* Lorenz 2002) *Cypreaovula* – в честь Олив Пиил (Mrs. Olive Peel), хорошо известного(ой) южно-африканского конхиолога.

peilei (форма *cervus cervus* Schilder 1932) *Macroscyprea* – в честь А. Джей Пейла (1868-1948).

pellucens (Melvill 1888) *Talostolida* - прозрачная, просвечивающаяся.

pericalles (подвид *pulchella* (Melvill & Standen 1904) *Contradusta* – очень красивая (согласно Ф.А. Шилдеру).

perlae Lopez & Chiang 1975 *Zoila* – в честь Перла Чанг (Perla Chang).

permarginata (подвид *algoensis* Lorenz 1989) *Cypreaovula* – сильно окаймленная.

persica (подвид *succincta* Schilder & Schilder 1938) *Erronea* – персидская.

pervelata (подвид *bregeriana* Lorenz 2002) *Contradusta* – глазированная, покрытая глазурью.

petiformis (форма *angelicae* Lorenz & Hubert, 1993) *Zonaria* – предположу – напоминающая **petitiana**

petilirostris Darragh 2002 *Umbilia* – с маленькими окончаниями (рострами).

petitiana (Crosse 1872) *Zonaria* - в честь Sauveur **Petit de la Saussaye**, 1792-1870, редактора французского журнала "Journal de Conchyliologie" [*Zonaria pyrum petitiana* (Crosse, 1872), *Neritina petiti* (Recluz, 1841), likely *Haminoea petiti* (d'Orbigny, 1841)].

piae (подвид *owenii* Lorenz & Chiapponi 2005) *Bistolida* – нет данных.

picta (Gray 1824) *Zonaria* - разрисованная, покрытая орнаментом.

piperita (Gray 1825) *Notocyprea* – перченая, посыпанная перцем.

polynesiae (форма *vitellus vitellus* Schilder & Schilder, 1939) *Lyncina* – полинезийская, из Полинезии.

polyphemus (подвид *teramachii* Lorenz 2002) *Nesiocypraea* – в честь греческого мифологического одноглазого циклопа Полифема сына Посейдона, пленником которого был Одиссей. (Наверное нужно оговорить, что Ф. Лоренц в оригинальном описании назвал: Полифем, сын Нептуна). Завиток раковины похож на большой глаз циклопа.

poppei (подвид *caputdraconis* Martin 1989) *Monetaria* – а честь известного малаколога и дилера с о. Магтан Филиппины Гвидо Поупа, автора многих книг по раковинам. Фото в главе с



названиями на букву «G». [*Angaria poppei* Monsecour & Monsecour, 1999, *Bayritrochus poppei* Anseeuw, 2003, *Calliostoma poppei* Vilvens, 2000, *Conus poppei* Elsen, 1983, *Cypraea caputdraconis poppei* Martin, 1989, *Cysticus poppei* Cossignani, *Eosipho poppei* Fraussen, 2001, *Euthria poppei* Fraussen, 1999, *Fusinus guidonis* Delsaerd, 1995, *Granulifusus poppei* Delsaerd, 1995, *Ischnochiton poppei* P. Kaas & R. A. Van Belle, 1994, *Jujubinus poppei* Curini-Galletti, 1985, *Lopha poppei* Bozzetti, 1996, *Lyria poppei* Bail, 2002, *Marginella poppei* Boyer & Neefs, 1999, *Mitra poppei* Guillot du Suduiraut, 2000, *Murex poppei* Houart, 1979, *Olivella poppei*

Bozzetti, 1998, *Ovula poppei* Fehse, *Phenacovolva poppei* Fehse, *Poireiria poppei* Houart, 1993, *Strombus guidoi* Man in't Veld & De Turck, 1998, *Tegula poppei* Lan, 1991, *Terebra poppei* Terryn, 2004, *Tritonoturris poppei* Vera Pelaez, Vega Luz, 2000]. (Около 25 раковин названы **poppei** и несколько **guidoi**). На фото Гвидо и Филипп Поупы. (Фото с сайта <http://www.conchology.be>)

poraria (Linnaeus 1758) *Erosaria* – пористая, с пятнами, напоминающими поры.

porteri (Cate 1966) *Lyncina* - в честь Джозефа А. Портера (Mr. Joseph A. **Porter**) из Замбоанга Филиппины (Zamboanga City, Philippines), нашедшего голотип раковины.

profunda (форма *venusta roseopunctata* Raybaudi 1990) *Zoila* – глубоководная.

profundorum (подвид *capensis* Seccombe 2003) *Cypraeovula* – глубоководная.

propinqua (форма *carneola carneola* Garrett 1879) *Lyncina* – близкая, соседняя.

pseudocellata (форма *marginalis marginalis* Schilder, F.A. & M. Schilder, 1938) *Erosaria* – псевдо (фальшивая) *ocellata*

pseudoteres (Lorenz & Barbier 1992) *Talostolida* – псевдо (фальшивый) *teres*.

pulchella (Swainson 1823) *Contradusta* – довольно красивая.

pulchra (Gray 1824) *Luria* – красивая.

pulchroides (подвид *lurida* Alvarado & Alvarez 1964) *Luria* – напоминающая *pulchra*.

pulicaria (Reeve 1846) *Notocypraea* – (с) подобными блохе (пятнами).

punctata (Linnaeus 1771) "*Notadusta*" - с пунктирными зонами

purissima (форма *erosa chlorizans* Vredenburg 1919) *Erosaria* – чистая, светлая.

pyriformis (Gray 1824) *Erronea* - грушевидная

pyrum (Gmelin 1791) *Zonaria* – груша.

Q:

quinquefasciata (подвид *caurica* (Röding 1798) *Erronea* – пятиполосная *caurica*.

queenslandica (форма *hirasei hirasei* Schilder 1966) *Austrasiatica* – из Квинсленда, Австралия.

quadrifasciata (Gray 1824) *Eclogavena* – с четырьмя пятнами.

quasigracilis (форма *fimbriata durbanensis* Lorenz 1989) *Purpuradusta* – подобная, похожая на *gracilis*.

R:

rabaulensis (Schilder 1964) *Erronea* – от названия города и порта Рабаул на о. Новая Британия (Папуа-Новая Гвинея).




rashleighana (Melvill 1888) *Talostolida* - в честь Джонотана Рашлега младшего (Jonathan **Rashleigh** Jr., 1845-72), британского коллекционера из Минабилли (Menabilly, Cornwall).

Статью о нем можно прочитать в "HSN" 1980 № 6

Ray Summers

raysummersi (подвид *hammondae* Schilder 1960) *Purpuradusta* – в честь Рэймонда Саммерса (Raymond H. **Summers**, 1905-1983), офицера ВВС США и конхиолога-любителя. [*Blasicrura summersi* (Schilder, 1958)].

Фото из «Hawaiian Shell News» 1963 – 11



Ray Summers at October 1963 HMS meeting.

reentsii (подвид *gangranosa* (Dunker 1852) *Erosaria* – в честь коллекционера из Гамбурга Г. Ринтса G. **Reents**, 18??-1???)

rotnestensis (подвид *exmouthensis* Lorenz 2002) *Cribrarula* – из района острова Роттнест, Западная Австралия.

rewa (подвид *geographica* (Steadman & Cotton 1943) *Leporicypraea* – нет данных.


rouxi (подвид *hirundo* (Ancey 1882) *Bistolida* - в честь Жана-Луи-Флорента-Полидора Роукса (Jean-Louis-Florent-Polydore **Roux**, (31 July) 1792-1833 (12 Apr.), [*Glycera rouxi* Audouin & H. Milne-Edwards, 1833, *Parablennius rouxii* (Cocco, 1833), likely *Natica rouxi* Nicklès, 1952, possibly *Cypraea hirundo rouxi* Ancey, 1882, possibly *Monodaeus rouxi* (Carpentier, 1951)].

redimita (подвид *lamarckii* (Melvill 1888) *Erosaria* – обвязанная, обвитая.

rosea (подвид *mapa* (Gray 1824) *Leporicypraea* – розовая, состоящая из роз.

rhinoceros (подвид *pallidula* (Souverbie 1865) *Blasicrura* – носорог.

reevei (Sowerby 1832) *Austrocypraea* – в честь Лоувелла Августуса Риви (Lovell Augustus **Reeve**, 1814-65 (July), английского коллекционера и автора работ о раковинах. [*Lepidozona reevei* P. Kaas & R. A. Van Belle, 1987, *Dentalium reevei* Fischer 1871, *Murex reevei* E. Vokes, 1965, *Enaeta reevei* (Dall, 1907), *Barbatia reeveana* (d'Orbigny, 1846), *Acrosterigma reeveanum* Dunker, 1852, *Austrocypraea reevei* (Sowerby, 1832), *Conus (Asprella) lovellreevei* Raybaudi Massilia, 1993].



robertsi (Hidalgo 1906) *Pseudozonaria* - в честь Шервуда Рэймонда Робертса (Sherwood Raymond **Roberts**, 1845-1928), американского конхиолога. [*Zonaria robertsi* (Hidalgo, 1906)].

rosselli (Cotton 1948) *Zoila* – в честь Харольда Росселя (Harold **Rossell**), коллекционера из Фримантла Западная Австралия, открывшим вид.

rubiginosa (подвид *stolida* (Gmelin 1791) *Bistolida* - имеющая ржаво-красный, оранжево-красный цвет (зубов)

roseoimmaculata (форма *venusta roseopunctata* Raybaudi 1985) *Zoila* – розовая, без пятен.
roseopunctata (подвид *venusta* Raybaudi 1985) *Zoila* – (с) розовыми пятнами.

Синонимы:

raybaudii marginata Lorenz, 1992 (син. *orientalis*) *Zoila* - в честь доктора Dr. Luigi **Raybaudi Massilia** Sep.) 1913-, Rome итальянского коллекционера и знаменитого малаколога
Strombus decorus raybaudii Nicolay & Manojka, 1983





rumphi (форма или синоним *isabella*) В честь Джорджа Эверхарда Румфа (Румфиуса Georgius Everhardus **Rumph(ius)**, 1628 (или 1627)-1702, талантливого голландского натуралиста, предшественника К.Линнея, проведшего большую часть своей жизни на о. Амбон. Ряд, имен живых организмов, данных Румфом были использованы К.Линнеем. В честь него названы: [*Entemnotrochus rumphii* (Schepman, 1879), и видимо *Rumphelia* Bayer, 1955]. Несмотря на то, что не совсем понятно, что названо *rumphi Isabella*, выдающаяся личность ученого заслуживает упоминания его в данном разделе.

S:

sakurarii (Habe 1970) *Austrasiatica* – в честь доктора Киничи Сакураи (Dr. Kin'ichi **Sakurai**), японского коллекционера и конхиолога *Pholadomya (Panacca) sakurarii* Habe, 1958, *Diaphana sakurarii* Habe, 1976, *Polyschides sakurarii* (T. Kuroda & T. Habe in Habe, 1961).

samoensis (подвид *caurica* Lorenz 2002) *Erronea* – из Самоа.

sanctae-helenae (подвид *acicularis* (Schilder 1930) *Erosaria* - в честь острова Святой Елены в Атлантическом океане.

sanfrancisca (форма *algoensis permarginata* Chiapponi 1999) *Cypraeovula* –

sanguinolenta (Gmelin 1791) *Zonaria* – кроваво-красная, покрытая кровью (относится к боковым пятнам).

satiata (подвид *rosselli* Lorenz 2002) *Zoila* – насыщенная.

saturata (форма *talpa* Dautzenberg 1903) *Talparia* – насыщенная.

saulae (Gaskoin 1843) *Palmadusta* - в честь мисс Джейн Саул (Miss Jane **Saul**, 1807-95), британской владелицы шелл-кабинета, названной Гаскойном «любезным и либеральным коллекционером» [*Schizodesma sauliae* Gray, *Chicoreus (Triplex) saulii* (Sowerby 1834), *Ocenebra sauliae* L. A. Reeve].

scarabaeus (форма *poraria* Bory 1827) *Erosaria* – жук-скарабей.

schilderiana (форма *tigris* Cate 1961) *Cypraea*-в честь профессора Франца Алфреда Шилдера, *schilderorum* (Iredale 1939) *Lyncina* – в честь семьи известных малакологов - профессора Франца Алфреда Шилдера (Prof. Franz Alfred **Schilder**, (13 Apr.) 1896-1970 (11 Aug.), немецкого химика и малаколога и его жены доктора Марии Шилдер (Dr. Maria **Schilder** (née Hertrich), (4 Aug.) 1898-1975 (30 July), также малаколога [*Schilderia* Tomlin, 1930, *Margovula schilderorum* Cate 1973, *Lyncina schilderorum* (Iredale, 1939), *Cypraea tigris* Linnaeus 1758 f. *schilderiana* Cate, 1961]. В ее честь также названа *Annepona mariae* (Schilder, 1927) и в честь их дочери Франциски (Francisca) названа *Bistolida hirundo francisca* (Schilder & Schilder, 1938).



Фото из журнала «HSN» 1964 – 5.

scindata (подвид *maculifera* Lorenz 2002) *Mauritia* – разделенная, отделенная.

scurra (Gmelin 1791) *Mauritia* – скоморох, шут, балагур.

semiplota (Mighels 1845) *Staphylaea* – невразумительная, по мнению Шилдера –возможно от ошибочного написания *semipolita* – довольно полированная.

senegalensis (форма *pyrum* Schilder. 1928) *Zonaria* – сенегальская, из Сенегала.

serrulifera (Schilder & Schilder 1938) *Purpuradusta* – имеющая небольшую пилу.

sharoni (форма *lamarekii* Walles 1980) *Erosaria* – нет данных.

sherylae (форма *jeaniana* Raybaudi 1990) *Zoila* – в честь Шерил Эдингера, жены австралийского коллекционера и малаколога Эндрю Эдингера.

similis (форма *erosa* Gmelin 1791) *Erosaria* – Похожая, подобная

sinaiensis (подвид *pulchra* Heimann & Mienis 2000) *Luria* – из района Синайского полуострова, Синайская.

smithi (форма *pyriformis* Sowerby 1881) *Erronea* – в честь:

Эдгара Смита (Edgar Albert **Smith**, (29 Nov. - London) 1847-1916 (22 July), британского малаколога, с 1867 года работавшего в Британском музее. [*Calyptraea edgariana* Melvill, 1898, *Edgaria* Bourguignat, 1890, *Mitrolumna smithi* Dautzenberg & H. Fischer, 1896, *Turbonilla edgari* Melvill, 1896, *Sepia smithi* Hoyle, 1885, возможно *Neothais smithi* J. Brazier, 1889, *Poirieria smithi* M.M. Schepman 1911, *Distorsio smithi* (von Maltzan, 1884), *Libidoclaea smithi* (Miers, 1886].

ИЛИ

Sir James Edward **Smith**, 1759-1828, and transported to London. Smith, in 1785-86 also took the lead in initiating the Linnean Society of London (formally established in February 1788), a breakaway of the "Society for promoting Natural History", which had been founded in October 1782. He had planned the new society together with the Rev. Dr. Samuel Goodenough (q.v.) and the entomologist Thomas

Marshall, 17??-1819. Smith was the son of a wealthy silk-merchant from Norwich and had been interested in botany since childhood.

somaliana (подвид *chinensis* Lorenz 1989) *Ovatipsa* – из Сомали

somalica (форма *broderipii* Raybaudi 1981) *Lyncina* – из Сомали.

sorrentensis (форма *venusta episema* Schilder 1963) *Zoila* – с побережья Сорренто, Западная Австралия.

sowerbyana (подвид *cylindrica* Schilder 1932) *Erronea* – в честь знаменитой семьи художников и конхиологов Соверби, насчитывающая 10 представителей 4 поколений. Этот пункт заслуживает отдельного описания, выходящего за рамки статей.

spadicea (Swainson 1823) *Neobernaya* – каштановая.

sphaeridium (подвид *globules* Schilder & Schilder 1938) *Pustularia* – шар, сфера.

spurca (Linnaeus 1758) *Erosaria* – грязная, нечистая.

staphylaea (Linnaeus 1758) *Staphylaea* – напоминающая (похожая на) виноград.

stercoraria (Linnaeus 1758) *Trona* – подобная экскрементам, навозная.

stolida (Linnaeus 1758) *Bistolida* – глупая.

subcarnea (Beddome 1896) *Notocypraea* – с телесным оттенком.

sublaevis (подвид *bistrinotata* Schilder & Schilder 1938) *Pustularia* – почти гладкая.

sublitorea (Lorenz 1998) *Monetaria* – сублиторальная.

subteres (Weinkauff 1881) *Talostolida* – близкий, похожий на терес.

subviridis (Reeve 1835) *Erronea* – зеленоватая.

succincta (Linnaeus 1758) *Erronea* - Дорсум раковины с уменьшенными поясами

sulcidentata (Gray 1824) *Lyncina* – с зубами, подобными борозде.

suluensis (форма *mariae* Lorenz & Hubert, 1993) *Annepona* – из моря Сулу, Филиппины.

summersi (Schilder 1958) *Blasicrura* – в честь Рэймонда Саммерса (Raymond H. **Summers**, 1905-1983), офицера ВВС США и конхиолога-любителя. Небольшую статью о нем можно прочитать в журнале «Hawaiian Shell News» 1961 № 2.

Фото из «Hawaiian Shell News» 1963 -11



superba (форма *ketyana* Lorenz 2001) *Zoila* – восхитительная, превосходная.

superstes (форма *martini* Schilder 1930) "*Notadusta*" - восхитительная, превосходная.

suprasinum (подвид *decipiens* Lorenz 2002) *Zoila* - с акватории над (*supra*: лат. над) заливом Эксмаут (*sinus*: лат. бухта, залив)

surabajensis (подвид *walkeri* Schilder 1937) *Contradusta* – из Сурабайи (Surabaya), Ява, Индонезия.

surinamensis (Perry 1811) *Propustularia* – из Суринама, Суринамская

surinensis (подвид *guttata* Raybaudi 1978) *Perisserosa* – с острова Сурин Пхукет, Тайланд


T:

taitae (Burgess 1993) *Cribrarula* – в честь жены Кларенса Мильтона Бурджесса – Грэйс Таит (Grace Tait Burgess).

talpa (Linnaeus 1758) *Talparia* – крот.

tenuidon (подвид *leucodon* Lorenz 1998) *Lyncina* – с тонкими зубами.

teramachii (Kuroda 1938) *Nesiocypraea* - в честь Акибуми Терамаши (Mr. Akibumi **Teramachi**, (5 Nov.) 1898-1978 (6 Dec.), японского малаколога . [*Duplicaria teramachii* Burch, 1965, *Neoxylophaga teramachii* Taki & Habe, 1950, *Akibumia* Kuroda & Habe, 1959, *Teramachia* Kuroda, 1931, *Conus teramachii* T. Kuroda, 1956, *Atrina teramachii* T. Habe, 1953]. Имя его жены Katsu Teramachi увековечено в названии *Notadusta katsuae* (Kuroda, 1960). Фото из журнала «Hawaiian Shell News» 15(9): 5, 15(10) : 8.



*Evin Oshima visiting Akibumi Teramachi, doyen of Japan shell collectors in Tokyo, Japan. Evin can't take his eyes, or his hands, off *Conus teramachi*. Come to think of it, who could?*

teres (Gmelin 1791) *Talostolida* – продолговатая.

tessellata (Swainson 1822) *Luria* – шахматная (подобна шахматной доске).

testudinaria (Linnaeus 1758) *Chelycypraea* – черепаховая, подобная черепахе.

teulerei (Cazenavette 1846) *Barycupraea* - в честь доктора Тюлери (Dr. Teulère) Президента «Общества Линнея» г. Бордо (President of the Linnean Society of Bourdeaux).

thersites (Gaskoin 1849) *Zoila* – в честь персонажа «Илиады» Гомера – рядового воина греков Терсита. Гомер изобразил Терсита злым и безобразным болтуном, выступавшим против воли вождей. Видимо названа по аналогии, т.к. Терсит был горбатым.

thielei (подвид *quadrifasciata* (Schilder & Schilder 1938) *Eclogavena* – в честь Карла Хермана Джонаса Тили (Karl Hermann Johannes **Thiele**, (1 Oct.) 1860-1935 (5 Aug.), немецкого малаколога. [*Acarinus thielei* Lévi, 1958, *Clathria thielei* Hentschel, 1912, *Crella incrustans thielei* Hentschel, 1911, *Hymedesmia thielei* Alander, 1942, *Forcepia thielei* Lundbeck, 1905, *Higginsia thielei* (Topsent, 1892), *Axinella thielei* (Topsent, 1898), *Mycale thielei* Hajdu & Desqueyroux-Faundez, 1994, *Ophlitaspongia thielei* Burton, 1932, *Polymastia thielei* Koltun, 1964, *Thieleia* Burton, 1932, *Lepidozона thielei* Sirenko, 1975, *Cadulus thielei* Plate, 1908, *Amphitretus thielei* Robson, 1930, *Neoteuthis thielei* Naef, 1921, *Benthoctopus thielei* Robson, 1932, *Joculator thielei* Jay & Drivas, 2002, *Blasicrura quadrifasciata* (Gray, 1824) f. *thielei* Schilder & Schilder, 1938].

thomasi (Crosse 1865) *Erosaria* – в честь коллекционера из Бреста, Франция – Б.С. Томаса (B.C. **Thomas**). Возможно в его честь также названы *Chicoreus (Triplex) thomasi* (Crosse 1872) & *Rapana thomasiana* H. Crosse, 1861.

tigris (Linnaeus 1758) *Cupraea* - тигр.

titan (подвид *leviathan* Schilder & Schilder 1962) *Lyncina* – в честь Титанов из греческой мифологии, сыновей Урана и Геи. Их было шесть, и в честь которого именно названа раковина – мне неизвестно.

tomlini (подвид *cernica* Schilder, 1930) *Erosaria* – в честь Джона Томлина (John Read le Brockton **Tomlin**, (15 Aug. - Stoke Field, Elston, Nottinghamshire) 1864-1954 (24 Dec.), британского коллекционера и владельца шелл-кабинета, а также обширнейшей библиотеки по малакологии. *Proterato tomlini* Schilder, 1933, *Yoldiella tomlini* (Winckworth, 1932), *Xylophaga tomlini* B. Prasad, 1932, *Dentalium tomlini* Melvill, 1918].

Фото из Википедии.



topee (форма *ventriculus* Steadm. & Cotton) *Lyncina* – нет данных.

transkeiana (подвид *alfredensis* Lorenz 2002) *Cupraevovula* – с побережья Транскей, Южная Африка.

trenberthae (форма *comptoni* Trenberth 1961) *Notocupraea* – в честь В. П. Тренберта (Trenberth W.P.)

tristensis (подвид *mus* Petuch 1987) *Muracupraea* -

trizonata (подвид *punctata* (Sowerby 1870) "*Notadusta*" – с тремя зонами.

tuamotensis (форма *margarita* Lorenz, & Hubert, 1993) *Pustularia* – из района архипелага Туамоту, Французская Полинезия.

turdus (Lamarck 1810) *Erosaria* – дрозд.

U:

unifasciata (подвид *fimbriata* (Mighels 1845) *Purpuradusta* – с одной повязкой, с одним поясом.

ursellus (Gmelin 1791) *Bistolida* – маленький медведь, медвежонок.

V:

valentia (Perry 1811) *Leporicypraea* – в честь лорда Валентии (Lord **Valentia**), обеспечившего первый экземпляр ципреи. Его персону, похоже, идентифицируют с Джорджем Аннсли (George Annesley, Earl of **Mountnorris**, Viscount **Valentia**, 1769-1844), опубликовавшим «Вояжи и путешествия..» ("Voyages and travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia, and Egypt : in the years 1802, 1803, 1804, 1805, and 1806"). На фото справа (предположительно).



variolaria (ssp. подвид *chinensis* (Lamarck 1810) *Ovatipsa* – изменяющаяся, вводящая в заблуждение.

vasta (подвид *owenii* (Schilder & Schilder 1938) *Bistolida* – широкая, толстая, огромная.


vaticina (форма *subviridis* *subviridis* Iredale 1931) – пророческий.

ventricosa (форма *argus argus* Gray 1824) *Arestorides* – с раздутым брюшком

ventriculus (Lamarck 1810) *Lyncina* – брюшко, желудочек.

venusta (Sowerby 1846) *Zoila* – прекрасная, подобная Венере.

vercoi friendii Schilder 1930 *Zoila* – в честь Джозефа Верко (Sir Joseph Cooke Verco, (1 Aug. - Fullarton) 1851-1933 (19 July - Adelaide), австралийского физика и малаколога. Был президентом Королевского общества Южной Австралии в 1903-21. Почетный куратор отдела моллюсков Южно-Австралийского музея с 1814 г. [*Leda verconis* Tate, 1891, *Vercoia* Baker, 1904, *Sepia vercoi* W. Adam, 1979, *Acanthochites verconis* Torr & Ashby, *Chiton verconis* Torr & Ashby, *Ischnochiton verconis* Torr].



verdensium (подвид *spurca* (Melvill 1888) *Erosaria* – с островов Кабо-Верде.

vespacea (подвид *asellus* (Melvill 1905) *Palmadusta* – осиная (*vespa* – оса).

violacea (подвид *chinensis* (Rous 1905) *Ovatipsa* – фиалковая, фиолетовая.

violacincta (подвид *subteres* Lorenz 2002) *Talostolida* – с фиолетовой рамкой.

viridicolor (подвид *cernica* (Cate 1962) *Erosaria* – зеленого цвета.

viridis (подвид *mapa* (Kenyon 1902) *Leporicypraea* – зеленого цвета.

vitellus (Linnaeus 1758) *Lyncina* – значений перевода может быть два. Ф.А. Шилдер полагает – яичный желток. Приведу статью из «Латинско-русского словаря» под ред. И.Х. Дворецкого: vitellus, I m [denim. к vitullus] 1) теленочек, бычок Pl; 2) яичный желток C, P, PM.

vittata ziczac (Deshayes 1831) *Palmadusta* – украшенная повязками, лентами.

vivia (подвид *pallidula* (Steadman & Cotton 1953) *Blasicrura* – живая.

volvens (Fazzini & Bergonzoni 2004) *Cypraeovula* – вращающаяся, катящаяся.

vredenburgi Schilder 1927 *Erronea* - в честь Е.В. Вреденбурга (Ernest Watson **Vredenburg**, 1870-1923).

W:

waikikiensis (подвид *fimbriata* Schilder 1933) *Purpuradusta* – из района Вайкики, Гавайи.

walkeri (Sowerby 1832) *Contradusta* – вероятно в честь преподобного доктора Джона Уокера (Dr. John **Walker**, 1731-1803), профессора натуральной истории Эдинбургского университета и главы церковного прихода Moffat; в 1812 г. посмертно были опубликованы его «Эссе о натуральной истории» ("Essays in Natural History", Edinburgh) . В честь него названы: [*Walkeria* Fleming, 1823. Доктор Л.Хейман пишет, что название дано в честь Б. Уокера (1856-1936), что невозможно – смотри год описания.

westralica (форма *armeniaca* Raybaudi 1980) *Umbilia* – из Западной Австралии (западно-австралийская).

westralis (форма *histrion* Iredale 1935) *Mauritia* - из Западной Австралии (западно-австралийская).

winckworthi (форма *turdus* Sch. & Sch) *Erosaria* – в честь Уитворта (не смог уточнить какого конкретно).

wattsi (подвид *mauiensis* Lorenz 2001) *Pustularia* – нет данных.

wilkinsi (форма *comptonii mayi* Griffiths 1959) *Notocypraea* – в честь Уилкинса, английского малаколога.

X:

xanthadon (Sowerby 1832) *Erronea* – с желтыми зубами

Y:

yaloka (форма, вариация *humpreysi*) – напоминающая раскраску птичьих яиц (на островах Фиджи).

Z:

zadela (подвид *cribraria* Iredale 1939) *Cribrarula* –нет данных.

zebra (Linnaeus 1758) *Macrosyraea* – зебра, подобная зебре.

ziczac (Linnaeus 1758) *Palmadusta* – зигзаг (по мнению Ф.А. Шилдера – варварское слово для зигзаг).

zonaria (Gmelin 1791) *Zonaria* – поясная, опоясанная, зонированная

